

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)
для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____
Факультет _____ Группа _____ Курс _____
Практический навык (раздел практических навыков)

Измерение наружных размеров таза

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Установить контакт с пациенткой (поздороваться, представиться), объяснить беременной женщине цель, необходимость и ход выполнения манипуляции, получить ее согласие. Провести гигиеническую антисептику кожи рук и одеть одноразовые перчатки. Обработать пуговицы тазомера антисептиком. Положение женщины: лежа на кушетке - для измерения поперечных размеров таза (<i>distantia spinarum</i> , <i>distantia cristarum</i> , <i>distantia trochanterica</i>): беременная лежит с обнаженным животом на спине, ноги сведены между собой и выпрямлены. Стать справа от женщины лицом к ней. Взять тазомер обеими руками так, чтобы шкала была обращена кверху, а большой и указательные пальцы лежали на пуговках тазомера. Не выпуская тазомер из рук, указательными пальцами прощупать передневерхние ости подвздошных костей с двух сторон (лат. - <i>spina iliaca anterior superior</i>), поставить пуговицы тазомера на эти точки по наружному краю и прижать к костным ориентирам таза. Это расстояние называется <i>Distantia spinarum</i> (лат.), в норме - 25-26 см.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Не отнимая пуговок тазомера от предыдущих точек, пуговицы тазомера передвигаем с остей по наружному краю гребня подвздошных костей (лат. - <i>crista ossis ilei</i>) до максимального расхождения ножек тазомера (наиболее отдаленные точки). Это расстояние называется <i>Distantia cristarum</i> (лат.), в норме - 28-29 см.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Указательными пальцами найти наиболее выдающиеся точки больших вертелов бедренных костей, ставим пуговицы тазомера на эти точки. Это расстояние называется <i>Distantia trochanterica</i> (лат.), в норме - 30-31 см.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	Для измерения прямого размера – положение женщины: на боку спиной к врачу, нижняя нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, верхняя нога выпрямлена. Указательным пальцем левой руки найти верхний угол ромба Михаэлиса (место сочленения V поясничного и I крестцового позвонков), а указательным пальцем правой – середину верхненаружного края симфиза. Измерить это расстояние тазомером, оно называется <i>Conjugata externa</i> (лат.) (размер Боделока), в норме 20-21 см. Обрабатываем тазомер антисептиком. Проводим гигиеническую антисептику кожи рук.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	Оценить полученные результаты (указать размеры таза).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	<i>Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале</i>	

Преподаватель _____
Дата _____