



**УО «Белорусский государственный  
медицинский университет»**



# **ОБРАЩАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ И КАНДИДОЗНЫМ СТОМАТИТАМИ НА АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ И ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ПРИЕМАХ**

**Кафедра стоматологии детского возраста**

**Грибовская Маргарита Олеговна, 4 курс, педиатрический факультет**

**Научные руководители:**

**к.м.н., доцент Мельникова Е.И.,**

**к.м.н., доцент Кленовская М.И.**

**19-20 апреля 2023 г.**

## **Цель исследования:**

изучить частоту обращаемости детей с герпетическим и кандидозным стоматитами на амбулаторном педиатрическом и стоматологическом приемах.

## **Задачи:**

1. Изучить частоту обращаемости детей с герпетическим стоматитом в зависимости от течения, формы заболевания и возраста детей.
2. Изучить частоту обращаемости детей с кандидозным стоматитом в зависимости от течения, формы заболевания и возраста детей.
3. Изучить участие в лечении детей врача-педиатра и врача-стоматолога-детского.
4. Изучить назначаемое лечение детей с герпетическим и кандидозным стоматитами врача-педиатра и врача-стоматолога-детского.

Большинство поражений слизистой оболочки полости рта у детей имеют инфекционную или травматическую этиологию. Анализ показателей заболеваемости слизистой оболочки полости рта свидетельствует о их распространенности в диапазоне от 4,1% до 69,5%. Наиболее часто наблюдаемыми поражениями у детей признаны герпетическая инфекция, кандидоз и травматические поражения (Catherine H. L. Hong et al, 2019). Острые стоматиты приводят к нарушению сна, питания и активности ребенка, особенно маленького. Родители зачастую не знают к какому специалисту следует обратиться с такой патологией, поэтому сталкиваться с вопросами диагностики и лечения герпетических и кандидозных стоматитов у детей раннего возраста могут как врачи стоматологи детские, так и педиатры.



*Рис. 1 – Herpes.*



*Рис. 2 – Candida.*

# Материал и методы

Проведено анкетирование 30 участковых врачей-педиатров и 33 врачей-стоматологов детских. В анкету включены 20 вопросов. Изучены и проанализированы стаж работы врачей по специальности, частота обращаемости детей на амбулаторном приеме с герпетическим и кандидозным стоматитами с учетом течения, формы заболевания и в зависимости от возраста детей.



*Рис. 3 – Педиатрический приём.*





*Рис. 4 – Стоматологический приём.*

# Результаты и их обсуждение

## Стаж работы по специальности

Рис.5 - Врачи-стоматологи.

Рис. 6 - Врачи-педиатры.



## Частота обращаемости детей с герпетическим стоматитом к специалистам

Рис. 7 – Врачи-стоматологи.





Рис. 8 – Врачи-педиатры.



## Частота обращаемости детей с кандидозным стоматитом к специалистам

Рис. 9 – Врачи-стоматологи.





Рис. 10 – Врачи-педиатры.



## Течение герпетического стоматита

Рис. 11 – Врачи-стоматологи.





Рис. 12 – Врачи-педиатры.



## Течение кандидозного стоматита

Рис. 13 – Врачи-стоматологи.




Рис. 14 – Врачи-педиатры.



## Форма тяжести герпетического стоматита у детей при амбулаторном обращении

Рис. 15 – Врачи-стоматологи.




Рис. 16 – Врачи-педиатры.



## Форма тяжести кандидозного стоматита у детей при амбулаторном обращении

Рис. 17 – Врачи-стоматологи.




Рис. 18 – Врачи-педиатры.





# Частота обращаемости с острым герпетическим стоматитом в зависимости от возраста детей

Рис. 19 – Врачи-стоматологи.





Рис. 20 – Врачи-педиатры.




# Частота обращаемости с острым кандидозным стоматитом в зависимости от возраста детей

Рис. 21 – Врачи-стоматологи.



Рис. 22 – Врачи-педиатры.



# Частота обращаемости с хроническим герпетическим стоматитом в зависимости от возраста детей

Рис. 23 – Врачи-стоматологи.





Рис. 24 – Врачи-педиатры.



# Частота обращаемости с хроническим кандидозным стоматитом в зависимости от возраста детей

Рис. 25 – Врачи-стоматологи.

- до 3 лет
- 3-6 лет
- 6-10 лет
- 11-15 лет
- старше 15 лет
- не диагностирован





Рис. 26 – Врачи-педиатры.



## Участие специалистов в лечении детей с герпетическим стоматитом

Рис. 27 – Врачи-стоматологи.





Рис. 28 – Врачи-педиатры.



## Участие специалистов в лечении детей с кандидозным стоматитом

Рис. 29 – Врачи-стоматологи.





Рис. 30 – Врачи-педиатры.



## Назначаемое лечение детям с герпетическим стоматитом

Рис. 31 – Врачи-стоматологи.





Рис. 32 – Врачи-педиатры.



## Назначаемое лечение детям с кандидозным стоматитом

Рис. 33 – Врачи-стоматологи.





Рис. 34 – Врачи-педиатры.



# Группы лекарственных препаратов, назначаемых для местного лечения детей с герпетическим стоматитом

Рис. 35 – Врачи-стоматологи.





Рис.36 – Врачи-педиатры.



# Группы лекарственных препаратов, назначаемых для местного лечения детей с кандидозным стоматитом

Рис. 37 – Врачи-стоматологи.





Рис. 38 – Врачи-педиатры.



# Группы лекарственных препаратов, назначаемых для общего лечения детей с герпетическим стоматитом

Рис. 39 – Врачи-стоматологи.





Рис. 40 – Врачи-педиатры.

## Группы лекарственных препаратов, назначаемых для общего лечения детей с кандидозным стоматитом

Рис. 41 – Врачи-стоматологи.





Рис. 42 – Врачи-педиатры.



## **Выводы:**

1. Более половины опрошенных врачей педиатров и стоматологов диагностируют герпетический стоматит с частотой 1 раз в месяц (56,7% и 42,4% соответственно). По течению заболевания герпетический стоматит на педиатрическом приеме диагностируется только острый, а на стоматологическом приеме на долю острого приходится 69,7%. К врачам педиатрам обращаются дети с герпетическим стоматитом чаще легкой формы (53,3%), а к врачам стоматологам средне-тяжелой формы заболевания (60,6%). В зависимости от возраста детей острый герпетический стоматит на стоматологическом приеме чаще диагностирован у детей до 3 лет (57,6%), а на педиатрическом – у детей 3-6-летнего возраста (50%). Хронический герпетический стоматит на стоматологическом приеме выявляется чаще у детей 6-10-летнего возраста (72,7%), а на педиатрическом – в возрасте 6-10 и 11-15- лет в равном соотношении (по 33,3%).

## **Выводы:**

2. Кандидозный стоматит на стоматологическом приеме чаще диагностируется 1 раз в 6 месяцев (48,5%), а на педиатрическом 1 раз в 3 месяца (36,7%). По течению заболевания кандидозный стоматит врачами педиатрами и стоматологами в большинстве случаев диагностирован как острый (90% и 75,8% соответственно). При обращении с кандидозным стоматитом на педиатрическом и стоматологическом приемах у большинства детей заболевание протекало в легкой форме (93,3% и 60,6% соответственно). С острым кандидозным стоматитом к педиатрам и стоматологам чаще обращаются дети в возрасте до 3 лет (63,3% и 100% соответственно). Хронический кандидозный стоматит педиатры регистрируют у детей в возрасте старше 15 лет (43,3%), а большинство стоматологов (48,5%) вообще не выявляют эту патологию.

## **Выводы:**

3. Немногим более половины врачей-педиатров считают о необходимости участия в лечении детей с герпетическим и кандидозным стоматитами (53,3% и 63,3% соответственно) только педиатра, а 66,6% врачей-стоматологов и 46,7% врачей-педиатров за совместное лечение.

## **Выводы:**

4. При лечении герпетического стоматита 86,7% педиатров и 87,9% стоматологов назначают общее и местное лечение, а кандидозного стоматита – 93,3% педиатров назначают общее и местное, более половины стоматологов (54,6%) только местное лечение. При лечении герпетического стоматита для местного лечения педиатры преимущественно назначают обезболивающие средства и антисептики (70%), общего – противовирусные (83,3%) и нестероидные противовоспалительные препараты (83,3%). На стоматологическом приеме местное лечение состоит из антисептиков (97%) и противовирусных (93,9%), а общее - из противовирусных (87,9%) и десенсибилизирующих (78,8%) препаратов. При лечении кандидозного стоматита на педиатрическом и стоматологическом приемах для местного лечения назначают антисептики (66,7% и 72,7% соответственно) и противогрибковые препараты (66,7% и 84,8% соответственно), для общего лечения противогрибковые препараты (90% и 36,4% соответственно).