

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневиц

\_\_\_\_\_ 2018 г.

Регистрационный № 013 - 0218



## МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА ПЕРИИМПЛАНТИТА

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования «Белорусский  
государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела; д-р мед. наук, проф.  
И. О. Походенько-Чудакова; канд. мед. наук, доц. Т. П. Павлович

Минск 2018

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения индекса периимплантита, который разработан для применения в комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику периимплантита.

Инструкция предназначена для врачей-стоматологов, врачей челюстно-лицевых хирургов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в дентальной имплантации, в стационарных и (или) амбулаторных условиях.

Область применения: стоматология.

### **ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАГЕНТОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И Т. Д.**

Набор стоматологических инструментов: стоматологическое зеркало, шпатель, стоматологический пинцет, пуговчатый зонд.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

К10.2 Воспалительные заболевания челюстей;

К10.28 Другие уточненные заболевания челюстей.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Противопоказаний не имеется.

### **ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА**

**I этап.** После установки дентальных имплантатов на 3 сутки, 7 сутки, 14 сутки и 30 сутки проводят сбор анамнеза и физикальный осмотр с целью определения степени выраженности у пациента болевого симптома, отека мягких тканей, наличия гиперемии и кровоточивости слизистой оболочки в области установленных дентальных имплантатов. После чего осуществляют оценку в баллах каждого из выше указанных показателей в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

**Клинические показатели послеоперационного состояния тканей  
в области дентальных имплантатов**

<b>Наличие болевых ощущений</b>	<b>Оценка в баллах</b>
Отсутствие боли	0 баллов
Незначительная болезненность	1 балл
Локализованная боль	2 балла
Выраженная разлитая боль	3 балла
<b>Наличие отека мягких тканей</b>	
Отсутствие отека	0 баллов
Отек мягких тканей, прилегающих к имплантату	1 балл
Отек в зоне установки имплантата с переходом на слизистую альвеолярного отростка челюсти	2 балла
Распространение отека за пределы сегмента	3 балла
<b>Распространение гиперемии слизистой оболочки</b>	
Отсутствие гиперемии	0 баллов
Гиперемия слизистой оболочки в зоне установки имплантата	1 балл
Гиперемия в зоне установки имплантата с переходом на слизистую альвеолярного отростка челюсти	2 балла
Распространение гиперемии за пределы сегмента	3 балла
<b>Кровоточивость мягких тканей в области установки имплантата</b>	
Отсутствие кровоточивости	0 баллов
Кровоточивость при зондировании	1 балл
Кровоточивость при прикосновении и/или самопроизвольная	2 балла

**II этап.** В соответствии с формулой полученные индивидуальные баллы суммируют и делят на 4 (число исследуемых клинических показателей).

$$\text{Индекс периимплантита} = \frac{\text{Сумма индивидуальных баллов}}{4}$$

**III этап.** При значении баллов от 0 до 1 констатируют отсутствие периимплантита; значения 1,1–6,0 соответствуют начальной стадии периимплантита, значения баллов 6,1–9,9 соответствуют средней стадии периимплантита, при значении баллов от 10 и выше определяют тяжелую стадию периимплантита в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

**Оценка индекса периимплантита в баллах**

<b>Индекс периимплантита</b>	<b>Стадии периимплантита</b>
0–1	Отсутствие периимплантита
1,1–6,0	Начальная стадия периимплантита (мукозит)
6,1–9,9	Средняя стадия периимплантита (воспаление надкостницы в области костной ткани, окружающей имплантат)
10 и выше	Тяжелая стадия периимплантита (воспаление костной ткани в области имплантата)