

Зновец Т. В.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

*Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Барановская Е. И.,
д-р мед. наук, проф. Жаворонок С. В.*

*Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

Актуальность. В условиях эпидемиологического неблагополучия со значительным ростом хронических форм вирусного гепатита С (ВГС) опасность вовлечения женщин фертильного возраста в эпидемиологический процесс является весьма высокой.

Цель: изучить медико-социальные факторы ВГС у беременных.

Задачи:

- 1 Изучить медико-социальные особенности беременных с ВГС.
- 2 Оценить связь механизма инфицирования ВГС с медико-социальными аспектами.

Материалы и методы. Проведено обследование 103 беременных больных хроническим ВГС на базе УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е. В. Клумова» г. Минска. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета STATISTICA 6,0.

Результаты и их обсуждение.

Согласно пути заражения беременные были разделены на 3 группы: 1-я – 23 (22,33%) с половым путем инфицирования ВГС, 2-я – с парентеральным механизмом при употреблении наркотиков либо после переливания инфицированной крови – 24 (23,3%), 3-я – 56 (54,37%) с неустановленным источником. Соответственно группам возраст составил $29,17 \pm 4,56$, $30,14 \pm 4,67$ и $29,18 \pm 5,46$ лет; высшее образование имели 56,5%, 45,8% и 32,2% пациенток. Во 2-й группе незарегистрированные отношения с партнером отметили 20,8% беременных, подвержены пристрастию к приему алкоголя 4,2%, употребляют наркотики 20,8%. Положительный HCV-статус диагностирован у 65,2% партнеров беременных 1-й группы, 12,5% – 2-й и 1,7% 3-й групп. Нарушения менструальной функции в анамнезе отмечены у 12,5% во 2-й группе против 4,3% в 1-й и 3,57% в 3-й группах. ИППП до беременности диагностированы у 65,2% женщин 1-й группы.

Выводы:

- 1 Путь заражения ВГС остается неустановленным у большей доли беременных (54,37%).
- 2 Для полового механизма инфицирования ВГС характерна высокая частота ИППП (65,2%).
- 3 Женщины, заразившиеся ВГС парентеральным путем, подвержены пристрастию к приему алкоголя (4,2%), употреблению наркотиков (20,8%).
- 4 При вне половом механизме инфицирования женщин ВГС установлена высокая частота дискордантных пар.