

*Гомлякова М. Ю.*

## **ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С.*

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Охрана материнства и детства – одно из приоритетных направлений развития государства. А проблема невынашивания беременности была и остается, не смотря на высокоэффективные методы диагностики и лечения, одной из важнейших проблем современного акушерства. Невынашивание беременности – это самопроизвольное ее прерывания в сроки от зачатия до 37 недель, считая с первого дня последней менструации. Кроме большого стресса для беременной женщины, угроза прерывания в ранние сроки влияет на течение беременности и исходы родов.

**Цель:** изучить исходы беременности и родов у женщин с угрозой прерывания в первой половине беременности.

**Задачи:**

1 Выявить возможные факторы риска угрозы прерывания беременности на ранних сроках.

2 Изучить течение беременности и исходы родов при угрожающем невынашивании в первой половине беременности.

3 Подтвердить необходимость своевременной диагностики и терапии угрозы прерывания беременности в ранних сроках для предупреждения неблагоприятных исходов.

**Материалы и методы.** В исследовании участвовали 51 женщина. Критерии включения: молодые женщины (возраст 18-30 лет), первая одноплодная беременность, отсутствие экстрагенитальной патологии, наличие кровянистых выделений из половых путей различной интенсивности. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни и историй родов отобранных женщин, находящихся на стационарном лечении в гинекологических и акушерских отделениях УЗ «1 ГКБ» г. Минска в период с 2011 по 2013 гг. по поводу угрозы прерывания беременности, а в дальнейшем по причине родов.

**Результаты и их обсуждение.** Выявлены особенности семейного статуса и условий труда исследуемых беременных женщин, которые могут служить неблагоприятным психоэмоциональным фоном для течения беременности. Выявлен высокий процент преждевременных родов, раннего излития околоплодных вод и аномалий родовой деятельности.

**Выводы:**

1 Большое количество социальных факторов риска, даже у соматически здоровых женщин, может провоцировать угрозу прерывания беременности.

2 Течение беременности и родов имеет свои особенности у женщин, перенесших угрозу прерывания в ранние сроки.