

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневиц

«26 октября» 2020 г.

Регистрационный № 001-0120

**МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д.м.н., профессор И.О. Походенько-Чудакова, к.м.н., доцент
Т.Л. Шевела, к.м.н., доцент А.М. Матвеев

Минск, 2020

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод лечения осложнений протезирования зубов с опорой на дентальные имплантаты, который направлен для применения в комплексе медицинских услуг у пациентов при протезировании.

Инструкция предназначена для врачей - стоматологов, врачей челюстно-лицевых хирургов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с дентальными имплантатами в амбулаторных и (или) стационарных условиях, и (или) в условиях отделения дневного пребывания.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАГЕНТОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И Т. Д.

- 1) стоматологическая установка;
- 2) набор стоматологических инструментов: стоматологическое зеркало, шпатель, стоматологический пинцет, пуговчатый зонд;
- 3) ручные инструменты для снятия зубных отложений;
- 4) ультразвуковой скейлер;
- 5) антисептик хлоргексидина биглюконат 0,05%, местный анестетик раствор Артикаина 4% в ампулах по 2,0 мл;
- 6) антибактериальные лекарственные средства.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

К10.2 Воспалительные заболевания челюстей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказания соответствуют таковым для медицинских изделий, реагентов и лекарственных средств, необходимых для реализации метода, изложенного в настоящей инструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

1. Проводят удаление мягких и твердых зубных отложений в области установленных имплантатов и полости рта;
2. Назначают антибактериальную терапию;
3. При отсутствии десневой манжетки в области имплантата проводят пластику местными тканями с целью создания прикрепленной десны;
4. При наличии патологического кармана между имплантатом и слизистой оболочкой десны проводят кюретаж грануляционной ткани в области патологического кармана и заполнение дефекта кости остеотропным материалом;
5. При подвижности имплантата проводят удаление имплантата и проведение повторной имплантации через 4-6 месяцев.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При соблюдении перечня указанных показаний и точном использовании метода, осложнения исключены.