

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Перкуторное определение границ относительной сердечной тупости

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
6	Озвучил название метода обследования «Перкуторное определение границ относительной сердечной тупости», объяснил ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
8	Предложил пациенту освободить грудную клетку от одежды	
9	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	
10	Расположил пациента в вертикальном положении (или по показаниям в положении	

	сидя) обращая его лицом к источнику света, руки пациента опущены вниз, вдоль туловища	
Основной этап		
<i>Сердечный толчок:</i>		
11	Пропальпировал область сердца ладонью правой руки, обращенной основанием кисти к груди	
12	Сделал заключение о сердечном толчке	
<i>Верхушечный толчок</i>		
13	Начал пальпацию верхушечного толчка с пальпации всей ладонью правой руки области сердца	
14	Определил верхушечный толчок II – IV пальцами правой руки	
15	Определил локализацию верхушечного толчка левой рукой: – по вертикальной линии (на каком расстоянии находится верхушечный толчок от левой среднеключичной линии); – по горизонтальной линии (посчитать в каком межреберье).	
16	<p>Дал характеристики верхушечного толчка:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>локализация верхушечного толчка</i> – по вертикальной линии: - до 2 лет – на 1-2 см кнаружи от левой среднеключичной линии, - от 2 до 7 лет – на 1 см кнаружи от нее, - от 7 до 12 лет – по среднеключичной линии - старше 12 лет – на 0,5 см кнутри от ЛСК линии. – по горизонтальной линии: до 1,5 лет – в IV межреберье, пациенты старше 1,5 лет и подростки в V межреберье. ➤ <i>площадь</i> площадь – 1х1 см (ограниченный), более – 1х1 см (разлитой). ➤ <i>сила (резистентность)</i> сила – субъективно определяется размером силы, которую нужно применить для препятствия выпячиванию грудной клетки во время систолы. В норме толчок умеренной силы. ➤ <i>высота (величина)</i> высота – оценивается по амплитуде колебаний межреберных промежутков во время систолы. В норме – умеренной высоты. 	
<i>Перкуторно последовательно определил границы относительной сердечной тупости сердца (применяя тихую перкуссию)</i>		
<i>Правая граница</i>		

17	Начал перкуссию со II-III межреберья по правой средне-ключичной линии, палец-плессиметр поставил параллельно ребрам и проперкутировал вниз по средне-ключичной линии до печеночной тупости; в каждой точке перкуссии нанес пальцем– «молоточком» 2 коротких перкуSSIONНЫХ удара по средней фаланге пальца плессиметра	
18	Достигнул печеночной тупости, поднялся на 1 межреберье, палец-плессиметр поставил параллельно искомой границе и провел перкуссию снаружи кнутри (по направлению к передней срединной линии)	
19	При достижении притупления звука отметил границу по наружной стороне пальца-плессиметра (по стороне пальца обращенной к более ясному перкуторному звуку) *	
<i>Левая граница</i>		
20	Поставил палец-плессиметр параллельно искомой линии на передней подмышечной линии в межреберном промежутке кнаружи от верхушечного толчка	
21	Удар нанес четко в направлении спереди – назад (ортоперкуссия), границу отметил по наружному краю пальца	
<i>Поперечный размер сердца</i>		
22	Измерил ширину поперечного размера сердца сантиметровой лентой после нахождения правой и левой границ Нормативы поперечного размера сердца: до 2 лет – 6-9 см. 2-7 лет - 8-12 см. 7-12 лет – 9-14 см. > 12 лет – 9 – 14 см.	
<i>Верхняя граница</i>		
23	Установил палец-плессиметр в I межреберье по парастернальной линии (у детей раннего возраста – по средне-ключичной линии) слева	
24	Провел перкуссию сверху вниз, до появления притупления перкуторного звука	
25	Отметил границу по верхнему краю пальца	
<i>Ширина сосудистого пучка</i>		
26	Установил палец-плессиметр во 2 межреберье по правой средне-ключичной линии параллельно	

	искомой границе и провел перкуссию снаружи – кнутри	
27	Отметил при достижении притупления звука границу по наружной стороне пальца-плексиметра	
28	Установил палец-плексиметр во 2 межреберье по левой средне-ключичной линии параллельно искомой границе и провел перкуссию снаружи – кнутри	
29	Отметил при достижении притупления звука границу по наружной стороне пальца-плексиметра	
30	Сделал общее заключение по границам относительной сердечной тупости	
Заключительный этап		
31	Поблагодарил пациента	
32	Сообщил пациенту, что осмотр закончен и можно одеваться (помог одеться)	
33	Обработал руки гигиеническим способом	
	Всего 66 баллов (минимум 53 балла)	Оценка зачтено/ не зачтено

*деонтологически правильно производить отметки на коже пациента после нахождения искомой границы только косметическим карандашом, с последующим обязательным снятием отметки гигиенической салфеткой

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия