

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Определение менингеальных симптомов

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Надел средства защиты (маску для лица медицинскую одноразовую нестерильную)	
2	Поздоровался с пациентом *	
3	Представился пациенту *	
4	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
6	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
7	Озвучил название метода обследования «Определение менингеальных симптомов», объяснил ход и цель обследования	
8	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
9	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	
10	Пациент находится в горизонтальном положении, в постели без подушки, его руки расположены вдоль туловища	
Основной этап		
11	Для оценки ригидности мышц затылка – пациенту, лежащему на спине, положил свою	

	<p>левую ладонь под затылок пациента и пассивно наклонил его голову вперед до соприкосновения подбородка с грудью</p>	
12	<p>Сделал заключение о наличии или отсутствии ригидности мышц затылка <i>Симптом считается положительным, если при определении ригидности мышц затылка подбородок пациента не достаёт груди и возникает болевая реакция</i></p>	
13	<p>Для оценки симптома Кернига пациенту, лежащему на спине, согнул ногу в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом</p>	
14	<p>Разогнул ногу в коленном суставе</p>	
15	<p>Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома* **симптом Кернига определять обязательно с двух ног <i>Симптом считается положительным, если ногу не удастся разогнуть в коленном суставе из-за резкого сопротивления сгибателей голени и болевой реакции.</i></p>	
16	<p>Для оценки симптома Брудзинского верхнего – пациенту, лежащему на спине, положил свою левую ладонь под затылок пациента и пассивно наклонил его голову вперед до соприкосновения подбородка с грудью</p>	
17	<p>Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Брудинского верхнего <i>Симптом считается положительным, если определение ригидности мышц затылка вызывает произвольное сгибание ног в тазобедренном и коленном суставах</i></p>	
18	<p>Для оценки симптома Брудзинского среднего – пациенту, лежащему на спине, надавил ребром ладони на лобковую область</p>	
19	<p>Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Брудинского среднего <i>Симптом считается положительным, если при надавливании на лобковую область происходит сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах</i></p>	
20	<p>Для оценки симптома Брудзинского нижнего – пациенту, лежащему на спине,</p>	

	пассивно согнул ногу в тазобедренном суставе и разогнул ее в коленном суставе	
21	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Брудинского нижнего* <i>Симптом считается положительным, если при пассивном сгибании одной ноги в тазобедренном суставе и разгибании ее в коленном суставе происходит произвольное сгибание другой ноги</i> ***симптом Брудинского нижний определять обязательно с двух ног	
22	Сделал общее заключение по наличию или отсутствию менингеальных симптомов	
Заключительный этап		
23	Снял и поместил маску для лица в емкость для дезинфекции	
24	Обработал руки гигиеническим способом	
	Всего 48 баллов (минимум 38 баллов)	Оценка зачтено/ не зачтено

*в реальной ситуации словесный контакт с пациентом затруднен или отсутствует из-за возможного наличия менингеального синдрома, пункты 2-8 выполнять с родителем или законным представителем

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия