

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине  
«Пропедевтика детских болезней»  
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_

Практический навык (раздел практических навыков)

**Определение размеров печени по Курлову. Оценка полученных данных с учетом возраста ребёнка.**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
6	Озвучил название метода обследования «Определение размеров печени по Курлову. Оценка полученных данных с учетом возраста ребёнка», объяснил ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
8	Уточнил самочувствие пациента на момент осмотра	
9	Предложил пациенту освободить от одежды верхнюю половину туловища	
10	Расположил пациента в горизонтальном положении в постели, с подушкой, руки пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах	

13	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые	
Основной этап		
14	Приступил к перкуссии печени по правой среднеключичной линии, сначала сверху вниз, расположив палец-плексиметр на уровне 3 – 4 межреберья перпендикулярно к срединной линии, до изменения перкуторного звука с легочного на укороченный («печеночная тупость»)	
15	Отметил уровень изменения звука, поставив точку над пальцем-плексиметром (со стороны ясного перкуторного звука), точка 1	
16	Расположил палец-плексиметр по наружному краю прямой мышцы живота справа, на 1 – 2 см ниже пупка и провел перкуссию по направлению вверх, к нижнему краю печени	
17	Отметил уровень изменения звука, поставив точку под пальцем-плексиметром (со стороны ясного перкуторного звука), точка 2	
18	Не проводя перкуссию, отметил точку верхнего края печени по срединной линии (на уровне определенной ранее точки по среднеключичной линии), точка 3	
19	Расположил палец-плексиметр по срединной линии (белой линии живота), на 1 – 2 см ниже пупка и провел перкуссию по направлению вверх, к нижнему краю печени.	
20	Отметил уровень изменения звука, поставив точку под пальцем-плексиметром (со стороны ясного перкуторного звука), точка 4	
21	Расположил палец-плексиметр перпендикулярно нижнему краю левой реберной дуги на уровне передней подмышечной линии, направление движения перкуссии – к срединной линии, по нижнему краю реберной дуги, до получения укорочения звука	
22	Отметил уровень изменения звука, поставив точку левее пальца-плексиметра (со стороны ясного перкуторного звука), точка 5	
23	Определил первый размер печени (расстояние между точками 1 и 2)	
24	Определил второй размер печени (расстояние между точками 3 и 4)	

25	Определил третий размер печени (расстояние между точками 3 и 5)	
26	Озвучил норму размеров печени для данного возраста	
27	Сравнил полученные результаты с нормой	
<b>Заключительный этап</b>		
22	Поблагодарил пациента	
23	Уточнил у пациента самочувствие	
24	Разрешил пациенту одеться (или помог)	
25	Обработал руки гигиеническим способом	
26	Сделал соответствующую запись в истории болезни или амбулаторной карте	
<b>Всего 52 балла (минимум 42 балла)</b>		<b>Оценка зачтено/ не зачтено</b>

Преподаватель  
Дата \_\_\_\_\_

И.О.Фамилия