

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневиц

_____ 2018 г.
Регистрационный № 013 - 0218



МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА ПЕРИИМПЛАНТИТА

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования «Белорусский
государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела; д-р мед. наук, проф.
И. О. Походенько-Чудакова; канд. мед. наук, доц. Т. П. Павлович

Минск 2018

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения индекса периимплантита, который разработан для применения в комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику периимплантита.

Инструкция предназначена для врачей-стоматологов, врачей челюстно-лицевых хирургов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам, нуждающимся в дентальной имплантации, в стационарных и (или) амбулаторных условиях.

Область применения: стоматология.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАГЕНТОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И Т. Д.

Набор стоматологических инструментов: стоматологическое зеркало, шпатель, стоматологический пинцет, пуговчатый зонд.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

К10.2 Воспалительные заболевания челюстей;

К10.28 Другие уточненные заболевания челюстей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказаний не имеется.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

I этап. После установки дентальных имплантатов на 3 сутки, 7 сутки, 14 сутки и 30 сутки проводят сбор анамнеза и физикальный осмотр с целью определения степени выраженности у пациента болевого симптома, отека мягких тканей, наличия гиперемии и кровоточивости слизистой оболочки в области установленных дентальных имплантатов. После чего осуществляют оценку в баллах каждого из выше указанных показателей в соответствии с табл. 1.

