

*Захарова Е. Я.*

## **ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ РИСКОМ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ (ВУИ)**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Павлюкова С. А.*

*Кафедра акушерства и гинекологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Проблема ВУИ становится ведущей в акушерстве в связи с повышением уровня инфицирования беременных, рожениц и родильниц, высоким риском неблагоприятных гестационных и перинатальных исходов.

**Цель:** определить исходы беременности и родов у женщин с высоким риском ВУИ.

### **Задачи:**

- 1 Изучить микрофлору влагалища исследуемых групп женщин.
- 2 Определить гестационные осложнения, осложнения родов и послеродового периода у женщин, инфицированных патогенной флорой.
- 3 Установить перинатальные исходы у женщин с патогенной флорой.

**Материалы и методы.** Проведено ретроспективное исследование 65 историй родов и новорожденных на базе 3 ГКБ им. Е. В. Клумова г. Минска. На основе проанализированного материала сформировано 2 группы: первая – 35 женщин с патологической флорой влагалища, вторая группа контрольная – 30 женщин с нормальной флорой по результатам бактериологического исследования. Женщины сопоставимы по возрасту и по гинекологическому анамнезу.

**Результаты.** Микробный пейзаж первой группы составляли: *E. Faecalis* и *E. Coli* у 28,57% обследуемых, *St. Aureus* и *Str. Agalactiae* у 11,43%, *Pr. Mirabilis* у 2,89%; и ассоциации: *E. Coli* + *E. Faecalis* у 11,43%, *E. Faecalis* + *C. Albicans* и *E. Cloacae* + *E. Coli* у 2,89%. Микрофлора второй группы представлена палочками Додерлейна. Наиболее частыми гестационными осложнениями пациенток первой группы были кольпит у 68,57%, анемия легкой ст. у 42,86%, ХФПН и ХВГП - по 28,57%, что значительно чаще, чем в контрольной группе. Увеличена частота родового травматизма и ПИОВ – по 14,28% случаев. Самым частым послеродовым осложнением стала анемия легкой ст. – 48,57%. Микрофлора новорожденных представлена: *E. Coli* у 12,5%, *E. Faecalis* у 5,89%, *Str. Epidermidis* и ассоциация *E. Coli* + *E. Cloacae* по 2,87%. Самыми частыми перинатальными осложнениями были неонатальная желтуха у 42,86%, врожденная пневмония и церебральная ишемия - по 8,57% случаев. Сосудистые (14,29%) и воспалительные изменения в плаценте отмечались чаще в первой группе.

### **Выводы:**

- 1 Среди патогенной флоры женщин преобладают *E. Coli* и *E. Faecalis*.
- 2 Наиболее частыми гестационными осложнениями стали кольпит, анемия легкой ст., ХФПН и ХВГП; осложнениями родов – ПИОВ и родовой травматизм; послеродовым осложнением - анемия легкой ст.
- 3 Среди микрофлоры новорожденных преобладают *E. Coli* и *E. Faecalis*. Наиболее частыми перинатальными осложнениями стали неонатальная желтуха, церебральная ишемия и врожденная пневмония.