

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

_____ Е.Л.Богдан

«_____» _____ 2025 г.

Регистрационный № _____

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д.м.н., профессор Шевела Т.Л., к.м.н., доцент Горбачев Ф.А.,
Белый М.Г,

Минск, 2025

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод реконструкции альвеолярной кости при установке дентального имплантата, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение адентии.

Инструкция предназначена для врачей-стоматологов-хирургов, врачей-челюстно-лицевых хирургов, врачей-стоматологов-ортопедов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с адентией верхней и (или) нижней челюсти, с периимплантитом в стационарных и (или) амбулаторных условиях, и (или) в условиях отделения дневного пребывания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Адентия верхней и (или) нижней челюсти (K08.1);
Периимплантит (K10.2);

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Противопоказания в соответствии с клиническим протоколом «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с частичной вторичной адентией», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.08.2022 № 84.

2. Иные противопоказания, соответствующие таковым для медицинского применения медицинских изделий, лекарственных препаратов, необходимых для реализации метода, изложенного в настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДР.

Средства индивидуальной защиты (медицинские перчатки, медицинские маски, очки, экраны и т.д.);
стоматологическая установка;
физиодиспенсер;
хирургический угловой наконечник;
ирригационная система;
трепан хирургический для углового стоматологического наконечника (диаметр 6 мм);
чашка Петри;
стоматологический слюноотсос;
стерильная насадка для слюноотсоса;
набор стерильных стоматологических инструментов;
стерильный одноразовый скальпель с лезвием №15 С;
кюретажная ложка;

антисептическое средство (0,05% водный раствор хлоргексидина биглюконата);

лекарственный препарат, предназначенный для местной анестезии(раствор Артикаина 4%, 2,0 мл и др.);

стерильный раствор 0,9% хлорида натрия;

стерильные марлевые валики;

хирургический шовный материал (Фтолен 5/0 – Футберг);

иглодержатель;

хирургические ножницы;

микрохирургический пинцет;

инструмент для измельчения аутогенного костного блока – костная мельница;

бинокулярные очки с увеличением 2,0хDA-4;

носитель информации (CD-диск, USB-флеш-накопитель и др.), позволяющий хранить данные конусно-лучевой компьютерной томографии пациента;

компьютер с характеристиками, не ниже следующих: процессор (Intel I7 или AMD с аналогичными характеристиками, или иной с аналогичными характеристиками); видеокарта: Nvidia Geforce 2050 (или AMD с аналогичными характеристиками, или иной с аналогичными характеристиками); оперативная память (ОЗУ): 8 Гб; объем свободного дискового пространства: 2 Гб на жестком диске (конечный объем занимаемого дискового пространства зависит от количества загруженных снимков).

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Метод, изложенный в настоящей инструкции, осуществляется поэтапно.

1. Определение плотности, высоты и ширины костной ткани в зоне установки дентального имплантата на основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии осуществляется общепринятым методом.

2. Предоперационная подготовка. За сутки до хирургической операции назначается антибактериальная терапия в соответствии с клиническим протоколом утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 августа 2022 г. № 84 «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с полной адентией», «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с частичной адентией» (Приложение 1,2)

3. Проведение хирургической операции:

3.1. местной инфильтрационной и (или) проводниковой анестезии;

3.2. внутрибороздковых разрезов слизистой оболочки на небной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти в проекции зубов 1.1 - 1.5 и (или) в проекции зубов 2.1 - 2.5;

3.3. отслойки слизисто-надкостничного лоскута;

3.4. трепанации костной ткани с помощью трепана, долота и остеотомов со скоростью вращения трепана 200 оборотов в минуту с последующим излечением трансплантата с небной поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти;

3.5. отделения хирургическим долотом и извлечение костного блока диаметром 5,0 мм, толщиной от 3,0 - 5,0 мм;

3.6. отсечения от костного блока свободного соединительнотканого трансплантата размером 1,0 x 0,5 см прямоугольной формы;

3.7. помещения в донорское ложе коллагеновой гемостатической губки и наложение отдельных узловых швов на слизистую оболочку твердого неба;

3.8. измельчения костного аутогенного блока диаметром в костной мельнице;

3.9. заполнения костного дефекта аутогенной костной стружкой с фиксацией соединительнотканого трансплантата на костную стружку;

3.10. установки дентального имплантата с погружением в костную ткань на глубину 4 мм, формирователя десневой манжетки, наложение отдельных узловых швов.

4. Оказание медицинской помощи в раннем послеоперационном периоде:

4.1. локальная гипотермия по 10 минут с перерывами по 60 минут в течение 3 часов;

4.2. назначение антибактериальной терапии, нестероидных противовоспалительных лекарственных средств в соответствии с клиническим протоколом утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 августа 2022 г. № 84 «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с полной адентией», «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с частичной адентией» (Приложение 2);

4.3. местный уход за операционной раной: инстилляцией раствором антисептика (водный раствор 0,05% хлоргексидина биглюконата и др.);

4.4. снятие швов на 10 сутки.

5. Рентгенологический контроль через 4-6 месяцев после операции в соответствии с п.1 настоящей инструкции.

Эффективность проведения метода альвеолярной реконструкции зубной альвеолы оценивается с помощью лучевого метода исследования. При эффективной реконструкции зубной альвеолы визуализируется костная ткань, ширина которой составляет 6,0 и более

мм, высота 15,0 и более мм, плотность костной ткани 800-1200 Ед. Хаунсфилда. При недостаточной эффективности применяемого метода следует повторить альвеолярную реконструкцию.

Перечень возможных осложнений или ошибок при выполнении и пути их устранения указан в таблице.

Таблица. Возможные осложнения или ошибки при проведении метода и пути их устранения

Возможные ошибки и осложнения	Пути устранения ошибок и осложнений
Аллергическая реакция на лекарственное средство применяемое при использовании метода	Тщательный сбор анамнеза, лечение в соответствии с клиническими протоколами
Развитие инфекционно-воспалительного процесса в зоне операции	Проведение первичной хирургической обработки гнойного очага, замена антибактериального препарата
Отторжение костного аутотрансплантата	Удаление костного аутотрансплантата, обработка раствором антисептика
Кровотечение из операционной раны	Коллагеновая гемостатическая губка, укладка и ушивание небного лоскута в исходное положение
Резорбция костной ткани зубной альвеолы	Хирургическая операция направленной костной регенерации с применением костных блоков
Разрыв слизистой оболочки десны	Отслаивание и мобилизация слизисто-надкостничного лоскута