

В.Г.Панкратов¹, Е.В.Коваленко², А.А.Лебедевская²

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С СИФИЛИСОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

¹Белорусский государственный медицинский университет,

²УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска

Волнообразное течение сифилитической инфекции характеризуется преобладанием ранних манифестных форм болезни в период бурного развития инфекции и снижение удельного веса манифестных форм сифилиса с одновременным ростом скрытых и поздних его форм во время нисходящей волны заболеваемости (В.Г.Панкратов и соавт, 2014). В последние 10 лет российские авторы констатируют интенсивное снижение общей заболеваемости сифилисом в основном за счёт ранних форм в Российской Федерации и Москве и резкое нарастание скрытых и поздних форм данной инфекции (А.А.Кубанова и соавт.,2014; Н.Н.Потекаев и соавт. , 2015).

Цель исследования: провести анализ эпидемиологической ситуации с заболеваемостью сифилисом в Республике Беларусь в период за 2006-2015 гг и оценить возможные перспективы её развития в ближайшие годы.

Материалы и методы.

Изучались отчётные статистические данные по заболеваемости сифилисом в Республике Беларусь в период с 2006 по 2015 годы.

Результаты

Нисходящая волна общей заболеваемости сифилисом в Республике Беларусь, начавшаяся в 1989-1990 гг., имеет свои особенности в отдельных регионах страны в период с 2006 по 2015 гг.

Относительная заболеваемость (число случаев на 100 000 населения) по РБ в целом снижалась ежегодно с 27,1/100 000 в 2006 г. до 7,2 сл. в 2015 г. (таблица 1), главным образом за счёт резкого снижения выявляемости ранних форм сифилиса. Повсеместно отмечен рост удельного веса скрытых форм сифилиса, а в последние 3 года - поздних форм сифилиса.

Таблица 1. Относительная заболеваемость сифилисом в 2006-2015 гг.

Области	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
г Минск	17,6	8,7	9,7	8,3	7,1	8,7	5,2	7,7	5,8	5,4
Брест	14,6	14,7	12,1	9,1	5,8	6,2	10,4	4,2	4,4	3,5
Витебск	49,7	42,5	31,4	29,8	17,2	13,9	13,4	11,1	10,6	7,8
Гомель	32,6	31,3	30,1	27,6	21,9	22,3	17,1	17,1	17,8	14,1
Гродно	16,9	12,7	10,3	10,6	7,8	11,5	11,9	6,9	4,1	3,3
Минская	27,7	22,5	18,9	18,2	9,7	8,0	8,0	6,9	7,6	8,1
Могилев	34,1	29,6	24,1	26,4	16,2	12,7	8,3	13,4	9,1	8,3
Р Б	27,1	22,5	19,0	18,0	12,0	11,7	10,3	9,5	8,5	7,2

В анализируемом периоде наиболее высокая заболеваемость сифилисом регистрировалась в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, наиболее низкая – в Гродненской и Брестской областях.

Таблица 2. Динамика удельного веса различных форм сифилиса в РБ в период с 2006 г. по 2015 г.

Клинические формы сифилиса	2006 г.	2009 г.	2012 г.	2015 г.
Все формы (абсолютные цифры)	2635	1709	977	696
Манифестные формы в %	46,6	40,3	38,0	24,6
Ранний скрытый сифилис в %	52,2	55,1	49,0	45,1
Поздние формы сифилиса в %	3,2	4,6	13,0	30,3

Из таблицы 2 видно, что удельный вес манифестных форм сифилиса (первичный и вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек) прогрессивно снижался, удельный вес скрытых форм сифилиса (ранние и поздние формы) повысился к 2009 г, но в дальнейшем ранний скрытый сифилис стал регистрироваться меньше (в 2015 г. только 45,1 %), а удельный вес поздних форм сифилиса прогрессивно нарастал из года в год, главным образом за счёт позднего скрытого сифилиса.

В целом по стране наблюдается нарушение 23-летней цикличности заболеваемости сифилисом, так как пик снижения ожидался в 2012-2013 гг. Но это зарегистрировано лишь в г. Минске, Минской и Могилевской областях (таблица 1).

Поскольку подъёмы заболеваемости сифилисом у нас исторически сопровождали войны или большие социально-политические катаклизмы (распад СССР), то спокойная, мирная и в целом хорошо обеспеченная жизнь абсолютного большинства населения Беларуси предполагает выход на средневропейский уровень заболеваемости сифилисом в ближайшие годы, т.е. 5-7 случаев на 100 000 населения.

Заключение

В период с 2006 г. по 2015 г. наблюдалось снижение общей заболеваемости сифилисом как по стране в целом, так и по отдельным областям, прежде всего за счёт снижения удельного веса ранних манифестных форм на фоне постоянного роста удельного веса скрытых и поздних форм. Предполагается выход заболеваемости сифилисом в Беларуси на средневропейские цифры заболеваемости в ближайшие 3-5 лет.

Pankratov V.G.¹, Kovalenko E.V.², Lebedevskaya A.A.²
Syphilis epidemiologic situation in the Republic of Belarus and possible variants
of its development

¹Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

²Minsk City Clinical Dermatovenereological Dispensary, Minsk, Belarus