

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННОГО ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА В ОБЛАСТИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ В АМБУЛАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Сурина А. В.

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь

Введение. Одонтогенный синусит верхнечелюстной пазухи (ВЧП) на основании данных стоматологических клиник диагностируется у 25–40% общего числа пациентов с воспалением придаточных пазух носа.

Цель работы – оценить эффективность тактики хирургического лечения одонтогенного хронического синусита в области дна верхнечелюстной пазухи в амбулаторных условиях.

Объекты и методы. Наблюдали 61 пациента, у которого на основании данных лучевых методов исследования констатировали ограниченные патологические изменения слизистой оболочки нижней стенки ВЧП в проекции «причинных» зубов, что соответствовало диагнозу хронический одонтогенный синусит. Пациентов разделили на две группы. Группа 1 – лица, которым операцию проводили способом, представленном в рационализаторском предложении № 1, выданном УО «БГМУ» 08.01.2015 года. Группа 2 – 20 пациентов, которым выполняли радикальную операцию на ВЧП. Клиническую эффективность нового способа хирургического лечения высчитывали по формуле NNT (Number Needed to Treat).

Результаты. Оценка проводилась на основании клинического обследования пациентов в отдаленные сроки наблюдения превышающие 6 месяцев после операции ($N_{1\text{эфф.}}$ — 40 пациентов; $N_{1\text{общ.}}$ — 41 пациентов; $N_{2\text{эфф.}}$ — 17 пациентов; $N_{2\text{общ.}}$ — 40 пациента; $NNT = 1,81$ — эффективность метода гипотетически высокая).

Заключение. Предложенная методика хирургического лечения позволяет уменьшить число осложнений более чем на 50%, что способствует повышению уровня оказания стоматологической помощи населению.