

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
Ю.Л.Горбич
13.12.2024 г.
Регистрационный № 078-0924



**МЕТОД КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ
ПЕРИОДОНТА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси С.П. Рубникович, д-р мед. наук, профессор Ю.Л. Денисова, К.Ю. Егорова

Минск, 2024

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод комбинированного лечения болезней пародонта с применением лекарственного средства «Маклейи листья» или аналога и вакуум-терапии, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение пациентов с болезнями пародонта.

Настоящая инструкция по применению предназначена для врачей-стоматологов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями пародонта в амбулаторных и(или)стационарных условиях, и(или) в условиях отделения дневного пребывания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Хронический простой маргинальный гингивит (K05.10 (здесь и далее код по Международной классификации болезней X пересмотра)).
2. Хронический гиперпластический гингивит (K05.11).
3. Хронический простой пародонтит (K05.30).
4. Хронический сложный пародонтит (K05.31).
5. Быстро прогрессирующий пародонтит (K05.4).
6. Симптоматический пародонтит (K05.5).
7. Эндопародонтит (K05.5).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства «Маклейи листья» или аналога.
2. Беременность, период лактации.
3. Возраст до 18 лет.
4. Грибковые поражения с явлениями экзематизации.
5. Заболевания печени и/или почек с нарушением функции.
6. Злокачественные и доброкачественные новообразования.
7. Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации.
8. Инфаркт миокарда и период после него (6 месяцев).
9. Иные противопоказания, соответствующие таковым для медицинского применения медицинских изделий и лекарственных препаратов, необходимых для реализации настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1. Лекарственное средство «Маклейи листья» (порошок крупный 1,5 г. в фильтр-пакетах) или аналог.
2. Набор инструментов стоматологический.
3. Стерильные ватные валики.

4. Шприц объёмом 5 мл, соединённый с пластиковой периодонтальной канюлей.
5. Вакуумный аппарат, создающий 20–30 мм рт. ст. (26,6–53,2 ГПа) остаточного давления.
6. Стеклопластиковая вакуумная кювета диаметром 7 мм.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

1. Свежеполученное водное извлечение лекарственного средства «Маклейи листья» используют для полоскания рта.
2. Проводят профессиональную гигиену ротовой полости.
3. После этапа скейлинга и корневого сглаживания профессиональной гигиены проводят ирригацию обрабатываемой области свежеполученным водным извлечением лекарственного препарата «Маклейи листья» из шприца объёмом 5 мл, соединённого с пластиковой периодонтальной канюлей.
4. Через сутки после проведения профессиональной гигиены пациентам проводят ежедневно (за исключением выходных дней) от 5 до 7 процедур вакуум-терапии с применением вакуумного аппарата.
5. После каждой процедуры вакуум-терапии проводят аппликации свежеполученным водным извлечением лекарственного препарата «Маклейи листья» на стерильных ватных валиках в течение 5 минут.
6. При хроническом гиперпластическом гингивите, периодонтите и эндопериодонтите дополнительно к п. 5 настоящей инструкции проводят ежедневную инстилляцию зубодесневых карманов на ватных турундах свежеполученным водным извлечением лекарственного препарата «Маклейи листья» (0,3– 0,5 мл на одну инстилляцию в течение 30 с).

Для домашнего использования пациентам рекомендуют полоскание свежеполученным водным извлечением лекарственного препарата «Маклейи листья» в объеме 10 мл 2 раза в день после чистки зубов в течение 5 дней.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Оценку эффективности лечения проводят на 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки после лечения с применением индексов: десневой индекс Loe, Silness – GI, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс – IPMA, периодонтальный индекс Russel – PI. При снижении показателей периодонтальных индексов до нормальных значений лечение считают эффективным. При недостижении нормальных значений показателей

данных индексов необходимо проведение повторного курса лечения через 1 месяц.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные осложнения могут быть связаны с несоблюдением инструкции по применению используемого лекарственного средства и техники проведения вакуум-терапии.