

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков):

оказание экстренной и неотложной медицинской помощи при приступе почечной колики

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах
1	Физикальное обследование	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
2	Купирование болевого синдрома (<i>нестероидные противовоспалительные средства: диклофенак 100 мг в сутки внутрь или ректально или в/м, или кеторолак 10-30 мг внутрь или в/м, или нимесулид 100 мг внутрь, или мелоксикам 7,5-15 мг внутрь; анальгезирующие средства центрального действия, опиоиды: трамадол 50-100 мг внутрь, в/м, тримеперидин 20 мг в/м 2-3 раза в сутки</i>).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
3	Назначение спазмолитиков (<i>папаверин в/м 40-60 мг 3-5 раз в сутки, или дротаверин внутрь или в/м до 80 мг в сутки</i>);	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
4	Назначение общего анализа мочи, общего анализа крови, биохимический анализ крови (креатинин, электролиты)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
5	Назначение ультразвукового исследования органов мочевой системы	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
6	Назначение обзорной и экскреторной урографии, РРГ	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
7	Назначение цистоскопии	
8	Катетеризация или стентирование почки	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
9	Подготовка к хирургическому лечению (<i>Вечером накануне операции – макрогол-4000 внутрь в дозе 64,0 на 20 кг веса пациента, или две очистительных клизмы с интервалом в 2 часа, утром в день операции – еще одна клизма</i>)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
10	Подготовка к хирургическому лечению (<i>профилактика ТЭЛА Всем больным старше 40 лет и при длительности операции более 1 часа, а так же при наличии других факторов риска тромбоземболии проводится профилактика тромбоземболических осложнений: назначение низкомолекулярных гепаринов подкожно: надропарин 0,3-0,6 мл (2850-11400 МЕ) один раз в</i>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1

	<i>сутки или дальтепарин 0,2-0,4 мл (2500-5000 МЕ) 1-2 раза в сутки, или эноксапарин 0,2-0,4 мл (20-40 мг) 1 раз в сутки, или гепарин 5000 МЕ п/к ежедневно (дозы антикоагулянтов, их предоперационное назначение и длительность применения могут варьироваться в зависимости от степени риска ТЭЛА, от конкретной клинической ситуации и массы тела больного);</i>	
11	Коррекция сопутствующей патологии..	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
12	Антибактериальная профилактика (<i>назначается индивидуально в зависимости от патологии, объема операции и сопутствующих заболеваний для профилактики прогнозируемых послеоперационных гнойно-септических осложнений за один час до операции в/м или перед введением наркозом в/в: цефалоспорины: цефепим 2,0, цефоперазон 2,0, цефотаксим 2,0, цефтриаксон 2,0, цефтазидим 2,0; фторхинолоны: офлоксацин 0,2, цiproфлоксацин 0,5; аминогликозиды: амикацин 0,5; при эндоурологических вмешательствах накануне процедуры фосфомицин 3,0 однократно</i>).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0,5 <input type="checkbox"/> 1
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия