

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков) Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах
1.	Надел маску, обработал руки гигиеническим способом (надел перчатки)	<i>2 – надел маску, перчатки, обработал руки; 1 – не надел маску или перчатки, или не обработал руки; 0 – не выполнил.</i>
2.	Установил контакт с пациентом (представился, идентифицировал личность пациента)	<i>2 – представился, идентифицировал личность пациента; 1 – не представился или не идентифицировал пациента; 0 – не установил контакт с пациентом.</i>
3.	Уточнил жалобы	<i>2 – жалобы уточнены в полном объеме (характер, интенсивность, локализация головной боли, слабость, головокружение, мелькание мушек перед глазами, боли в области сердца и др.); 1 – не уточнены наличие, локализация, характер, интенсивность; 0 – жалобы не уточнены</i>
4.	Собрал анамнез	<i>2 – собрал анамнез в полном объеме (время настоящего ухудшения, принятые лекарственные средства и их эффективность; время вызова бригады СМП; наличие в анамнезе аналогичных жалоб, наличие хронических заболеваний, принимаемые лекарственные средства на постоянной основе, наличие аллергических реакций на ЛС и др.); 1 – анамнез собран не в полном объеме; 0 – анамнез не собирался.</i>
5.	Провел физикальное обследование пациента	<i>2 – провел аускультацию сердца, легких, измерил АД на двух руках;</i>

		<p><i>1 – не провел физикальное обследование в полном объеме;</i></p> <p><i>0 – не провел физикальное обследование.</i></p>
7.	Измерил АД	<p><i>2 – первоначально измерено АД на двух руках далее измерялось с периодичностью, позволяющей мониторировать состояние пациента;</i></p> <p><i>1 – измерение АД не проведено на двух руках, проводилось только 2 раза (в начале и в конце оказания помощи);</i></p> <p><i>0 – измерение АД проводилось 1 раз или не проводилось.</i></p>
6.	Ознакомился с картой вызова бригады скорой медицинской помощи.	<p><i>2 – ознакомился с результатами данных карты вызова бригады СМП, уточнил у пациента динамику после приема лекарственных средств;</i></p> <p><i>1 – ознакомился с результатами данных карты вызова бригады СМП;</i></p> <p><i>0 – карта вызова бригады СМП не использовалась.</i></p>
8	Ознакомился с результатами ЭКГ в 12 отведениях	<p><i>2 – ознакомился с результатами ЭКГ дважды до постановки диагноза и после терапии;</i></p> <p><i>1 – ознакомился с результатами ЭКГ однократно;</i></p> <p><i>0 – поставил диагноз и/или назначил лечение без ознакомления с результатами ЭКГ.</i></p>
9	Поставил предварительный диагноз	<p><i>2 – поставил предварительный диагноз и обосновал его с указанием специфических жалоб и симптомов, данных осмотра и анамнеза, проведенных обследований</i></p> <p><i>1 – поставил предварительный диагноз без его обоснования;</i></p> <p><i>0 – диагноз не озвучен / диагноз ошибочен.</i></p>
10	Назначил Нифедипин ИЛИ Каптоприл ИЛИ Пропранолол 40 мг внутрь	<p><i>2 – назначен Нифедипин 5–10 мг сублингвально или Каптоприл 25–50 мг сублингвально или Пропранолол 40 мг внутрь;</i></p> <p><i>1 – лекарственное средство назначено без указания дозы и пути введения (уточнено медицинской сестрой);</i></p> <p><i>0 – доза или путь введения лекарственного средства указаны неверно (неправильная доза или путь введения лекарственного средства) или лекарственное средство не назначено.</i></p>
	ИЛИ Назначил Эналаприл	<p><i>2 – назначен 0,125 % раствор Эналаприла 1 мл (1,25 мг), в разведении</i></p>

		<p><i>1:10 на физ. растворе внутривенно медленно (мониторинг АД);</i></p> <p><i>1 – лекарственное средство назначено без указания дозы и пути введения (уточнено медицинской сестрой);</i></p> <p><i>0 – доза или путь введения лекарственного средства указаны неверно (неправильная доза, не разбавлен, введен одномоментно) или лекарственное средство не назначено.</i></p>
	ИЛИ Назначил Урапидил	<p><i>2 – назначен 0,5 % раствор Урапидила 5 мл (25 мг), в разведении 1:10 на физ. растворе внутривенно медленно (мониторинг АД);</i></p> <p><i>1 – лекарственное средство назначено без указания дозы и пути введения (уточнено медицинской сестрой);</i></p> <p><i>0 – доза или путь введения лекарственного средства указаны неверно (неправильная доза, введен одномоментно) или лекарственное средство не назначено.</i></p>
	ИЛИ Назначил Магния сульфат	<p><i>2 – назначен 25 % раствор Магния сульфат 5 мл, в разведении 1:10 на физ. растворе внутривенно струйно медленно (мониторинг АД);</i></p> <p><i>1 – лекарственное средство назначено без указания дозы и пути введения (уточнено медицинской сестрой);</i></p> <p><i>0 – доза или путь введения лекарственного средства указаны неверно (неправильная доза, введен одномоментно) или лекарственное средство не назначено.</i></p>
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Отметка в баллах: невыполнение – 0

частичное выполнение – 0,5

выполнение – 1

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия

Пример:

Практический навык (раздел практических навыков): интерпретация результатов гемостазиограммы

<i>№ п/п</i>	<i>Параметр выполнения действия</i>	<i>Отметка в баллах</i>
<i>1</i>	<i>Расчет протромбинового индекса (ПТИ)</i>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
<i>2</i>	<i>Расчет протромбинового отношения (ПТО)</i>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1
<i>3</i>	<i>Вычисление международного нормализованного отношения (МНО)</i>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
<i>4</i>	<i>Клиническая интерпретация полученного результата</i>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
	<i>Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале</i>	