

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)
для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____
Факультет _____ Группа _____ Курс _____
Практический навык (раздел практических навыков)

Ведение и прием родов в головном предлежании

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Изучение жалоб и данных обменной карты. Сбор анамнеза. Проведение общего обследования, специального наружного акушерского обследования, влагалищного исследования. Постановка диагноза и составление плана родоразрешения. (проговорить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Дать команду начать запись КТГ (длительностью не менее 30 мин каждые 3 часа до завершения родов) и провести катетеризацию периферической вены. (проговорить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Ведение партограммы. Влагалищное исследование каждые 4 часа или при изменении акушерской ситуации, а также для диагностики начала II периода родов.(проговорить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	При начале II периода родов –надеть маску, шапочку, обработать руки как перед хирургической операцией. Надеть стерильный халат и перчатки. Стерильной салфеткой с раствором антисептика, захваченной корнцангом, последовательно обработать лобок, большие половые губы, внутренние поверхности бедер, область ягодиц, промежности и ануса. Встать у ножного конца акушерского кресла напротив роженицы, промежность и область заднего прохода закрыть стерильной пленкой. (выполнить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	С момента врезывания головки – готовность к оказанию акушерского пособия (выполнить): <ul style="list-style-type: none"> • при прорезывании головки ладонные поверхности сомкнутых пальцев левой руки установить на промежности, предупреждая преждевременное разгибание головки • по окончании потуги большими и указательными пальцами правой руки над прорезывающейся головкой бережно растянуть вульварное кольцо, пока головка не приблизится теменными буграми к половой щели для выведения головки вне потуги • правая рука ладонной поверхностью перемещается на область промежности так, чтобы четыре пальца располагались на левой большой половой губе, отведенный большой палец – на правой большой половой губе, низводя ткани половых губ книзу, по 	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

	<p>направлению к промежности для уменьшения напряжения промежности</p> <ul style="list-style-type: none"> • при рождении теменных бугров и фиксации подзатылочной ямки к нижнему краю симфиза, с целью регулирования потуг, роженице запретить тужиться, предложив глубоко дышать открытым ртом. Правой рукой бережно сдвинуть ткани промежности со лба и лица плода кзади, ладонью левой руки осторожно поддерживать головку, приподымая ее вверх в момент ее разгибания и рождения • после наружного поворота головки и внутреннего поворота плечиков, головку плода обхватить обеими руками, помогая ее продвижению книзу, до рождения верхней трети переднего плечика. Затем левой рукой поддерживать головку так, чтобы ладонь находилась на задней щеке плода, и приподнимая головку кпереди, правой рукой сдвигая ткани промежности с заднего плечика. • ввести указательные пальцы рук со стороны спинки плода в подмышечные впадины, приподнимая туловище кпереди, и извлечь ребенка (выполнить). 	
6	Новорожденного вытереть сухой пеленкой, положить на живот матери, укрыть одеялом или пеленкой. Наложить на пуповину два зажима Кохера на расстоянии 8-10 и 15-20 см от пупочного кольца и пересечь пуповину между зажимами (не ранее чем через 1 минуту либо сразу у реузс-отрицательных рожениц). (выполнить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
7	Оценить новорожденного по шкале Апгар. (проговорить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
8	Выведение мочи роженицы с помощью катетера Фолея. Проверить наличие и назвать признак отделения плаценты Кюстнера- Чукалова, Шредера, Альфельда. Предложить роженице потужиться и родить послед. Осмотреть плодовую и материнскую поверхность плаценты, оболочки. (проговорить и выполнить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
9	Оценить объем кровопотери в родах, озвучить мероприятия по профилактике кровотечения. (проговорить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
10	Снять перчатки, хирургический халат и выбросить их в контейнер для дезинфекции отработанных медицинских изделий. Провести гигиеническую антисептику кожи рук. (выполнить)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель _____

Дата _____