

**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)**

для контроля практических навыков по учебной дисциплине  
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_

Практический навык (раздел практических навыков)

**Оценка методов обезболивания родов**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Установить контакт с пациенткой (поздороваться, представиться, объяснить цель предстоящего осмотра)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2.	Провести диагностику боли в родах на основании субъективных ощущений женщины с использованием визуально-аналоговой шкалы оценки боли или цифровой рейтинговой шкалы боли (прилагается)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3.	Оценить акушерскую ситуацию (характер родовой деятельности, состояние плода, раскрытие маточного зева)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4.	Провести выбор методов анальгезии: – При оценке более 4 ВАШ согласовать с врачом-анестезиологом проведение региональной анальгезии при соблюдении условий проведения регионарной анальгезии в родах и отсутствия противопоказаний для проведения регионарной анальгезии; – При выраженном болевом синдроме и отсутствии условий для регионарной анальгезии провести обезболивание родов лекарственными средствами группы анальгетиков – При невыраженном болевом синдроме осуществлять обезболивание роженицы приемами самообезболивания, свободным перемещением, принятием душа, самомассажем, управлением дыханием	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5.	На фоне проводимой медикаментозной анальгезии осуществлять мониторинг характера родовой деятельности, состояния плода	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	<i>Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале</i>	

Преподаватель \_\_\_\_\_


Дата \_\_\_\_\_

*Приложение к практическому навыку  
«Оценка методов обезболивания родов»*

**Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ: VAS)**

ВАШ представляет собой отрезок прямой длиной 10 см. Его начало соответствует отсутствию болевого ощущения – «боли нет» а конечная точка отражает нестерпимую боль – «невыносимая боль». Линия может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Пациенту предлагается сделать на ней отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болей. Расстояние между началом отрезка («боли нет») и сделанной отметкой измеряют в сантиметрах и округляют до целого. Каждый сантиметр на линии соответствует 1 баллу.

При отметке до 2 см боль классифицируется как слабая, от 2 до 4 см – умеренная, от 4 до 6 см – сильная, от 6 до 8 см – сильнейшая и до 10 см – невыносимая.



**Цифровая рейтинговая (числовая ранговая) шкала боли (ЦРШ: NRS)**

ЦРШ состоит из последовательного ряда чисел от 0 до 10.

Пациентам предлагается оценить интенсивность боли цифрами: 0 – боль отсутствует, 5 – умеренная боль и 10 – самая сильная боль, которую себе можно представить.

<i>Пожалуйста, оцените интенсивность боли, которую Вы испытываете в настоящее время</i>										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боли нет					Умеренная боль					Очень сильная боль