

Учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет»  
**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)**  
для контроля практических навыков по учебной дисциплине  
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_

Практический навык (раздел практических навыков)

**Первичная обработка новорожденного**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Сразу после рождения: обсушить ребенка стерильной, нагретой под источником лучистого тепла в течение 10–15 секунд, пеленкой на руках или на выдвижном столике для принятия плода.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Выложить ребенка на живот и грудь матери и завершить его обсушивание стерильной теплой и сухой пеленкой.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Клеммировать пуповину на расстоянии 5 см от пупочного кольца одноразовым стерильным пластиковым зажимом на животе у матери (повернуть ребенка на бок). Зажим Кохера наложить на расстоянии 3 см от пластикового, между ними пуповину пересечь стерильными ножницами, стерильной салфеткой отжать кровь. Пуповинный остаток не обрабатывать и марлевую салфетку не накладывать. Пересечение пуповины проводится не ранее чем через 60 с после рождения, после прекращения пульсации сосудов. Раннее пересечение пуповины (в первую минуту жизни) проводится при необходимости проведения новорожденному первичных реанимационных мероприятий, при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах С и В у матери и резус-сенсбилизации.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	Осмотреть новорожденного ребенка непосредственно после рождения на груди у матери с соблюдением правил тепловой защиты. Решить вопрос о необходимости санации верхних дыхательных путей и проведения реанимационных мероприятий.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	Взвесить новорожденного ребенка, измерить длину тела, окружности головы и грудной клетки.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6	Заполнить 3 бирки (браслета) из прорезиненной ткани, из которых две маленькие зафиксировать на ручках ребенка, а большую на одежде ребенка или пеленках, в которые он завернут.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
7	Надеть теплые шапочку и носки (при наличии). Укрыть ребенка стерильной чистой теплой сухой пеленкой и (или) одеялом.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
8	Провести оценку состояния новорожденного по шкале Апгар на 1-й и на 5-й минутах жизни.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
9	Приложить новорожденного ребенка по мере его готовности к груди матери в течение первого получаса жизни, придав ему правильное положение, не заставляя его брать грудь насильно.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
10	Наблюдать за здоровым новорожденным ребенком в течение всего времени пребывания в родильном зале матери с ребенком (не менее двух часов).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_