

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Перинеотомия, эпизиотомия, перинеоррафия, эпизиоррафия

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Определить показания и противопоказания для выполнения перинеотомии, эпизиотомии.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Обработать промежность раствором антисептика и обезболить (инфильтрационной или пудендальной анестезии).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Вне потуги браншу ножниц с тупым концом под контролем пальца ввести по направлению предполагаемого разреза между подлежащей частью плода и стенкой влагалища. При выполнении перинеотомии — разрез по средней линии промежности, где проходит минимальное количество сосудов и нервных окончаний. При выполнении латеральной эпизиотомии (может выполняться вправо или влево) — боковой разрез промежности, выполняется на 2–3 см выше задней спайки влагалища по направлению к седалищному бугру. При выполнении срединно-латеральной эпизиотомии (может выполняться вправо или влево) — разрез от задней спайки влагалища по направлению к седалищному бугру.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	Разрез произвести на высоте потуги, когда ткани промежности максимально растянуты (в тот момент, когда в схватку из половой щели показывается участок головки диаметром 3—4 см). Разрез не должен быть менее 3 см, в противном случае он продляется в рваную рану.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	После отделения последа, осмотреть шейку матки и слизистую влагалища посредством зеркал.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6	Выполнить местное обезболивание (2%-ный раствор лидокаина) или вызвать врача-анестезиолога для внутривенного наркоза.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
7	Восстановление тканей начать с наложения шва на угол раны, на слизистую оболочку влагалища до задней спайки.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
8	Наложить погружные швы на мышцы промежности и однорядные швы на кожу. Следить за тем, чтобы раневые поверхности плотно прилегали друг к другу, это будет способствовать хорошему заживлению.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
9	Обработать рану раствором йодискина.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
10	Пояснить роженице о необходимости соблюдения гигиенического режима и туалета раны в послеродовом периоде.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

Преподаватель _____

Дата _____