

Учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет»

**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)**

для контроля практических навыков по учебной дисциплине  
«Пропедевтика детских болезней»  
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_

Практический навык (раздел практических навыков)

**Определение локализации верхушек легких у детей (школьного возраста)**

№	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично-1 не выполнено – 0
1	Поздоровался с пациентом	
2	Представился пациенту и озвучил название метода обследования	
3	Уточнил Ф.И.О. пациента	
4	Уточнил возраст пациента	
5	Получил согласие пациента на проведение обследования	
6	Предложил пациенту освободить грудную клетку от одежды	
7	Расположил пациента в вертикальном положении (или в положении сидя) лицом к врачу, руки опущены вниз.	
8	Расположил палец-плессиметр справа горизонтально над ключицей на середине надключичной ямки.	
9	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара.	
10	Переместил палец-плессиметр вертикально вверх, параллельно ключице, немного медиальнее.	
11	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара.	
12	Провел перкуSSION до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
13	Отметил границу изменения перкуSSIONного звука справа.	
14	Измерил расстояние между ключицей и отмеченной границей, сделал вывод (высота верхушки легкого спереди справа- на 3 см выше ключицы).	

15	Расположил палец-плексиметр слева горизонтально над ключицей на середине надключичной ямки.	
16	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
17	Переместил палец-плексиметр вертикально вверх, параллельно ключице, немного медиальнее.	
18	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
19	Провел перкуссию до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
20	Отметил границу изменения перкуторного звука слева.	
21	Измерил расстояние между ключицей и отмеченной границей, сделал вывод (высота вершины легкого спереди слева- на 4 см выше ключицы).	
22	Расположил пациента в вертикальном положении (или в положении сидя) спиной к врачу, руки опущены вниз.	
23	Расположил палец-плексиметр справа в середине надостной ямки.	
24	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
25	Переместил палец-плексиметр косо в направлении к VII шейному позвонку справа.	
26	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
27	Провел перкуссию до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
28	Отметил границу изменения перкуторного звука справа.	
29	Сделал вывод (высота вершины легкого сзади справа- на уровне VII шейного позвонка).	
30	Расположил палец-плексиметр слева в середине надостной ямки.	
31	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
32	Переместил палец-плексиметр косо в направлении к VII шейному позвонку слева.	
33	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара.	
34	Провел перкуссию до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
35	Отметил границу изменения перкуторного звука слева.	
36	Сделал вывод (высота вершины легкого сзади слева- на уровне VII шейного позвонка).	
<b>Всего 72 балла (минимум 58 балла)</b>		<b>Оценка зачтено/ не зачтено</b>

**ФИО экзаменатора**

**Подпись**

**Дата**