

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков):

Определение ширины полей Кренига у детей (школьного возраста)

№	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично-1 не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом	
2	Представился пациенту и озвучил название метода обследования	
3	Уточнил Ф.И.О. пациента	
4	Уточнил возраст пациента	
5	Получил согласие пациента на проведение обследования	
6	Предложил пациенту освободить грудную клетку от одежды	
7	Расположил пациента в вертикальном положении, спиной к врачу, руки опущены вниз	
Основной этап		
8	Расположил палец-плессиметр справа на середине верхнего края трапециевидной мышцы, перпендикулярно ключице.	
9	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара (тихой перкуссией).	
10	Переместил палец-плессиметр по трапециевидной мышце кнутри (по направлению к шее).	
11	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуссионных удара (тихой перкуссией).	
12	Провел перкуссию до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	

13	Отметил границу изменения перкуторного звука.	
14	Расположил палец-плексиметр справа на середине верхнего края трапецевидной мышцы, перпендикулярно ключице.	
15	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
16	Переместил палец-плексиметр кнаружи по трапецевидной мышце.	
17	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
18	Провел перкуSSION до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
19	Отметил границу изменения перкуторного звука	
20	Измерил расстояние между отмеченными точками, сделал вывод (ширина полей Кренига справа- 4 см).	
21	Расположил палец-плексиметр слева на середине верхнего края трапецевидной мышцы, перпендикулярно ключице.	
22	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
23	Переместил палец-плексиметр по трапецевидной мышце кнутри (по направлению к шее).	
24	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
25	Провел перкуSSION до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
26	Отметил границу изменения перкуторного звука	
27	Расположил палец-плексиметр слева на середине верхнего края трапецевидной мышцы, перпендикулярно ключице.	
28	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
29	Переместил палец-плексиметр кнаружи по трапецевидной мышце.	
30	Нанес пальцем-«молоточком» 2 коротких перкуSSIONных удара (тихой перкуSSIONей).	
31	Провел перкуSSION до изменения ясного легочного звука на тупой звук.	
32	Отметил границу изменения перкуторного звука	
33	Измерил расстояние между отмеченными точками, сделал вывод (ширина полей Кренига слева- 5 см).	
	Всего 66 балла (минимум 53балла)	Оценка зачтено/ не зачтено

ФИО экзаменатора

Подпись

Дата