Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине «Пропедевтика детских болезней» для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИС	О студента	
	ультет Группа	Курс
Прав	ктический навык (раздел практических навыков)
Опр	еделение наличия у ребенка симптома Щёткина	-Блюмберга
No	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах:
п/п		выполнено
		полностью – 2,
		выполнено
		частично – 1,
		не выполнено – 0
	Подготовительный этап	T
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или	
	законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя	
	или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя	
	или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими	
	документами	
6	Озвучил название метода обследования «Осмотр	
	и поверхностная пальпация живота», объяснил	
	ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его	
	родителя или законного представителя) на	
	проведение обследования	
8	Уточнил самочувствие пациента на момент	
	осмотра	
9	Уточнил наличие болей в животе ранее и в	
	настоящее время	
10	Уточнил локализацию болей по ощущениям	
	пациента, попросив указать на место болевых	
	онглиений полгнем	

11 Предложил пациенту освободить от одежды верхнюю половину туловища 12 Расположил пациента в горизонтальном положении в постели, с подушкой, руки пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах 13 Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
 Расположил пациента в горизонтальном положении в постели, с подушкой, руки пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и 	
положении в постели, с подушкой, руки пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах 13 Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах 13 Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
коленных суставах 13 Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
 Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и 	
(кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
(кожным антисептиком), руки теплые 14 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
 Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и 	
расположенном на одном уровне с кушеткой Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
Основной этап 15 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
 Расположил теплую ладонь в правой подвздошной области Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и 	
подвздошной области 16 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
 Приступил к пальпации живота, получая ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и 	
ощущение податливости брюшной стенки и следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
следя за выражением лица пациента 17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
17 При подозрении на напряжение мышц передней брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
брюшной стенки провел сравнительную поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
поверхностную пальпацию живота двумя руками на симметричных участках справа и	
руками на симметричных участках справа и	
слева	
18 Попросив пациента глубоко дышать, приступил	
к глубокой пальпации в этой области,	
постепенно все глубже погружая ладонь на	
выдохе	
19 На короткое время зафиксировал ладонь в	
состоянии глубокого погружения, спросив,	
больно ли пациенту	
20 Затем быстрым движением извлек ладонь,	
уточнив наличие или отсутствие усиления болей	
21 При усилении болей – симптом Щёткина-	
Блюмберга положительный	
Заключительный этап	
22 Поблагодарил пациента	
23 Уточнил у пациента самочувствие	
24 Разрешил пациенту одеться (или помог)	
25 Обработал руки гигиеническим способом	
26 Сделал соответствующую запись в истории	
болезни или амбулаторной карте	
Всего 52балла (минимум 42 балла) Оценка не зачто	

Преподаватель	
Дата	

И.О.Фамилия