

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

совета по защите диссертаций Д 03.18.06 при УО «Белорусский государственный медицинский университет» по диссертации Копытова Дмитрия Андреевича «Нормоксическая лечебная компрессия в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 – наркология

Специальность и отрасль науки, по которой присуждена ученая степень

Диссертация Копытова Д. А. по актуальности проблемы, содержанию, основным научно обоснованным результатам, их новизне, практической и теоретической значимостям представляет собой законченную, самостоятельно выполненную квалификационную работу, соответствующую отрасли медицинские науки, специальности 14.01.27 – наркология.

Научный вклад соискателя в решение научной задачи с оценкой его значимости

Впервые научное обоснован и разработан комплексный метод лечения неосложненного синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии для повышения эффективности терапевтического воздействия. Проведен сравнительный анализ эффективности методов предлагаемого метода со стандартизированным лечением, установлены преимущества метода в отношении актуальных симптомов неосложненного синдрома отмены алкоголя. Результаты диссертационного исследования имеют высокую теоретическую и практическую значимость, вносят существенный вклад в решение важной научно-практической задачи включение авторского метода в комплексное лечение пациентов с неосложненным синдромом отмены алкоголя, что способствует улучшению качества оказания медицинской помощи.

Формулировка конкретных научных результатов (с указанием их новизны и практической значимости), за которые соискателю присуждена ученая степень

Ученая степень кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 – наркология присуждена Копытову Д. А. за новые, научно обоснованные результаты, включающие:

научное обоснование, адаптацию и разработку комплексного метода нормоксической лечебной компрессии в клинической наркологии и оптимальных его режимов для купирования неосложненного синдрома отмены алкоголя и его клинических феноменов (патологического влечения к алкоголю, психопатологических, сомато-неврологических, нейрокогнитивных функций, биологических маркеров) с доказательной эффективностью и безопасностью метода;

проведение сравнительного анализа комплексного метода нормоксической лечебной компрессии со стандартизированным лечением лекарственными средствами при лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя, что позволяет: снизить тяжесть патологического влечения к алкоголю с 1-го дня терапии за счет вегетативной и идеаторной ($p<0,05$), с 3-го – аффективной ($p<0,05$) составляющих; уменьшить сроки купирования клинических симптомов: осознаваемая потребность в алкоголе ($p<0,05$), заторможенность, неустойчивость внимания, дисфория ($p<0,05$), «выраженная истощаемость (утомляемость)» ($p<0,05$), а также повышает прогноз эффективности купирования симптомов, «головная боль», «нистагм», «выполнение координаторных проб» ($p<0,05$), «обложенность языка» ($p<0,05$), «отрыжка» ($p<0,05$), «повышенное АД» ($OR=2,6$; 95% CI [1,1–6,1]; $p<0,05$), «красный дермографизм» ($OR=3,2$; 95% CI [1,2–9,1]; $p<0,05$), «мраморный» рисунок кожи» ($OR=3,4$; 95% CI [1,2–10,2]; $p<0,05$), «жажды», «сухость во рту» ($OR=9,4$; 95% CI [3,5–24,9]; $p<0,05$); оказывать протективное влияние на функции кратковременной памяти после 1-го сеанса ($p<0,05$), эффективность умственной работоспособности ($p<0,05$); нормализовать уровни общего билирубина ($p<0,05$), обеспечить тенденцию восстановления уровней алкалоза с декомпенсированного до субкомпенсированного на 7-й день ($p<0,05$); после 3-го дня терапии оптимизировать pCO_2 ($OR=0,4$; 95% CI [0,21–0,76]; $p<0,05$, pO_2 – после 1-го ($OR=3,6$; 95% CI [1,9–6,9]; $p<0,05$), $SpO_2\%$ – после 1-го дня лечения ($OR=2,9$; 95% CI [1,5–6,0]; $p<0,05$).

оптимизацию лечебного процесса посредством включения в стандартизованное лечение лекарственными средствами метода нормоксической лечебной компрессии, который является технически малозатратным, не требующим специализированных дополнительных сложных инженерных коммуникаций (в сравнении с гипербарической оксигенацией), безопасным для организма, что позволяет его эффективно использовать не только на стационарном, но и на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

Разработана инструкция по применению: «Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии» № 068-0720 утв. 26.08.2020, результаты которой внедрены в лечебный процесс УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска, Республиканский научно-практический центр психического здоровья», УЗ «Минский городской клинический наркологический диспансер», УЗ Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология».

Зам. председателя совета
Ученый секретарь совета



А.П.Шепелькевич
И.А.Хрущ