

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

Д.Л. Пиневиц



« 17 » *августа* 20 *17* г.

Регистрационный № *112-1117*

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет»¹,

Учреждение здравоохранения «3-я городская клиническая больница
им. Е.В. Клумова» г. Минск²

Авторы: д.м.н., профессор Е.И. Барановская¹, Т.В. Зновец¹, д.м.н.,
профессор С.В. Жаворонок¹, Е.А. Гошкевич², И.Л. Шиптенко²

Минск, 2017

В настоящей инструкции по применению (далее - инструкция) изложен метод определения вероятности инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста (15-49 лет). Выполнение инструкции даст возможность дифференцированно подходить к обследованию женщин репродуктивного возраста на маркеры вирусного гепатита С в зависимости от полученного прогноза с целью своевременного выявления HCV-инфицированных пациенток, последующего диспансерного наблюдения и проведения противовирусного лечения. Своевременное выявление и лечение женщин с гепатитом С до наступления беременности позволит исключить перинатальную трансмиссию вируса гепатита С от матери ребенку.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-акушеров-гинекологов учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам репродуктивного возраста в амбулаторных условиях.

Показания к применению: женщины репродуктивного возраста (15-49 лет).

Противопоказания к применению: нет.

Перечень необходимого оборудования, реактивов, препаратов, изделий медицинской техники: не требуются.

Перечень необходимых лекарственных средств: не требуются.

Описание технологии использования метода

Выделение группы риска инфицирования вирусом гепатита С среди женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) с использованием прогностической таблицы.

Прогностическая таблица заполняется врачом-акушером-гинекологом или акушеркой смотрового кабинета при проведении диспансерного медицинского осмотра; обращении за медицинской помощью (не чаще 1 раза в год); по показаниям при выявлении новых факторов риска инфицирования вирусом гепатита С.

Таблица. - Прогностическая таблица инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста

Фактор риска	Номер и название диапазона фактора риска	Диагностический коэффициент
I. Социально-поведенческие факторы		
Возраст	1) До 28 лет	-1
	2) 29 лет и старше	+1
Уровень образования	1) Высшее или среднее специальное	-1
	2) Общее среднее, базовое или начальное	+3
Профессиональная занятость	1) Отсутствие постоянной работы	+2
	2) Работа в сфере обслуживания (продавец, контроллер-кассир, официант, бармен, парикмахер, горничная, кастелянша, специалист по туризму)	+3
	3) Другие специальности	-2
Курение	1) Да	+4
	2) Нет	-2
Длительность курения	1) Менее 5 лет	-5
	3) 11 лет и более	+4

Продолжение таблицы

Употребление наркотических веществ	1) Да	+12
	2) Нет	-1
Семейное положение	1) Не состоит в браке	+4
	2) Первый брак	-2
	3) Повторный брак	+7
Возраст начала половой жизни	1) До 17 лет	+2
	2) 18 лет и старше	-2
Число половых партнеров в течение жизни	1) До 3	-3
	2) 4 и более	+2
Контрацепция	1) Отсутствует	+3
	2) Барьерный метод	-2
	3) Физиологический метод	+1
	4) Оральные контрацептивы	-2
	5) Внутриматочная спираль	+5
II. Медицинские факторы		
ВИЧ-инфекция	1) Да	+12
	2) Нет	-1
Вирусный гепатит В	1) Да	+12
Венерические заболевания в анамнезе	2) Сифилис	+12
	3) Гонорея	+12
Хирургические вмешательства в анамнезе	1) Не было	-1
	2) Одно	+1
	3) Два и более	+4
Переливание компонентов крови в анамнезе	1) Да	+7
	2) Нет	-1
Беременности в анамнезе	1) Не было	-2
	3) Две и более	+2
Роды в анамнезе	1) Не было	-1
	2) Одни	+1
	3) Двое и более	-3
Медицинские аборты в анамнезе	1) Не было	-1
	2) Один	+3
	3) Два и более	+5

Продолжение таблицы

Сопутствующие гинекологические заболевания	1) Да	+1
	2) Нет	-3
Бесплодие	2) Первичное	-2
	3) Вторичное	+5
Хронический сальпингоофорит	1) Да	+3
СУММА БАЛЛОВ		

При опросе женщины репродуктивного возраста необходимо обвести номера диапазонов согласно имеющимся сведениям и суммировать соответствующие им диагностические коэффициенты. Если диапазон пропущен, диагностический коэффициент равен нулю. После суммирования диагностических коэффициентов, выполнить обследование на маркеры гепатита С у пациенток с высоким риском инфицирования вирусом гепатита С согласно алгоритму (рисунок).

Перечень возможных ошибок:

Недостаточно собранный анамнез у женщины репродуктивного возраста.



Рисунок. - Алгоритм определения вероятности инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста