

Голяк Ю. В.

АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Малевич Ю. К.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Кровотечения в послеродовом периоде не имеют тенденции к снижению, а наоборот их частота растет и будет оставаться на высоком уровне длительное время. В таких странах как Канада, США, Австралия и Великобритания отмечается увеличение акушерских кровотечений за последние 10 лет. Для их клинического и теоретического обсуждения повсеместно используется Т – аббревиатура, которая по нашему мнению требует дополнительного обсуждения.

Цель: определить полиморфизм и клиническую значимость Т – аббревиатуры в современном акушерстве.

Задачи:

- 1 Проанализировать причины и методы остановки кровотечений
- 2 в контексте общепринятой Т – аббревиатуры.
- 3 Предложить и дать клиническую оценку дополнительным аргументам и фактам попадающим под расширенную Т – аббревиатуру.

Материалы и методы. Проанализированы выписки из историй родов 25 рожениц с массивным послеродовым кровотечением, произошедших в различных родовспомогательных учреждениях города Минска в период с 2004 по 2015 гг. с неблагоприятным исходом (гистерэктомия, геморрагический шок, кома). Из общей группы женщин 12 (48,0%) были первородящие, 13 (52,0%) - повторнородящие в возрасте от 21 до 35 лет. В работе проводился анализ только основных причин и мероприятий по остановке кровотечений в послеродовом периоде без учета течения беременности и родов, а также их сопоставление с общепринятой Т – аббревиатурой.

Результаты и их обсуждение. Проведен сопоставление основных причин послеродовых кровотечений с общепринятой Т – аббревиатурой. Установлено, что во всех случаях имело место различное сочетание этиологических факторов, которое ранее в клиническом и теоретическом аспекте рассматривались отдельно. Выяснено, что недооценка этого факта приводит к некорректным и неэффективным лечебным мероприятиям. Предложены дополнительные звенья в этиопатогенез акушерских кровотечений с использованием Т – аббревиатуры.

Выводы:

- 1 Пересмотреть и расширить клиническую значимость Т – аббревиатуры акушерских кровотечений.
- 2 Сочетания нескольких причин является основной массивных акушерских кровотечений и требует доработки тактики по их остановке.