



МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Научно-практический рецензируемый журнал

Зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь
Свидетельство о регистрации № 25 от 17.02.2009 г.

Издается с 2002 года

Выходит один раз в три месяца

№ 1 (47) / 2014 Январь – март

Подписные индексы: в каталоге «Белпочты» – 00665; в каталоге «Роспечати» – 18300

Учредитель

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83. <http://www.bsmu.by>

Адрес для писем:
220006, г. Минск,
ул. Ленинградская, 6, каб.2
Тел.: 328-58-92
E-mail: Medjournal@tut.by

Издатель:
ИООО «Красико-Принт»
ЛИ №02330/0494499
от 08.04.2009 г.
220035, Беларусь,
г.Минск, ул.Тимирязева,
д.65 б, пом.142

Подписано в печать
с готовых диапозитивов
3.01.2014 г.

Бумага офсетная
Гарнитура FranklinGothicBookC
Печать офсетная
Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 18,6
Тираж 870 экз.
Заказ № 2929

Отпечатано
в РУП «Издательство «БДП»
Производство №1
220010, г.Минск,
ул.Мясникова, 37
ЛП №02330/04941079
от 03.04.2009 г.

© Белорусский
государственный медицинский
университет, 2014

Главный редактор А.Н. Стожаров, д-р биол. наук, проф.

Редакционная коллегия

А. В. Сикорский (ректор БГМУ, председатель редколлегии)
Е. В. Барковский (д-р биол. наук, проф., Минск)
Ф. И. Висмонт (д-р мед. наук, проф., член-корр. НАН Беларуси)
В. П. Дейкало (д-р мед. наук, проф., Витебск)
С. В. Жаворонок (первый проректор БГМУ, проф.)
И. А. Карпов (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. И. Кубарко (д-р мед. наук, проф., Минск)
О. К. Кулага (д-р мед. наук, проф., Минск)
Н. П. Митьковская (д-р мед. наук, проф., Минск)
Л. Ф. Можейко (д-р мед. наук, проф., Минск)
Т. В. Мохорт (д-р мед. наук, проф., Минск)
П. Г. Пивченко (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Прохоров (д-р мед. наук, проф., Минск)
И. В. Рачковская (д-р биол. наук, проф., Минск)
О. А. Скугаревский (д-р мед. наук, проф., Минск)
Н. Ф. Сорока (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Строцкий (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Сукало (д-р мед. наук, проф., член-корр. НАН Беларуси)
А. Д. Таганович (д-р мед. наук, проф., Минск)
Т. Н. Терехова (д-р мед. наук, проф., Минск)
С. И. Третьяк (д-р мед. наук, проф., Минск)
А.С. Федулов (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Хапалюк (д-р мед. наук, проф., Минск)
Г. Н. Чистенко (д-р мед. наук, проф., Минск)
С. Н. Шнитко (д-р мед. наук, проф., Минск)

Редакционный совет

А. Ю. Барышников (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
Ю. Е. Демидчик (д-р мед. наук, проф., Минск)
И. Н. Денисов (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
М. П. Захарченко (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
Э. В. Карамов (д-р мед. наук, проф., Москва)
С. С. Козлов (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
Ю. В. Лобзин (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Санкт-Петербург)
В. В. Малышев (д-р мед. наук, Санкт-Петербург)
М. И. Михайлов (д-р мед. наук, проф., член-корр. РАМН, Москва)
Яцек Никлинский (д-р мед. наук, проф., Белосток, Польша)
Нобору Такамура (профессор, Нагасаки, Япония)
П. И. Огарков (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
А. А. Руденко (д-р мед. наук, проф., Киев)
Томми Лайн (профессор, Стокгольм, Швеция)
Шуниши Ямашита (профессор, Фукусима, Япония)
Н. Д. Ющук (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
Редактор Л.И. Жук

В НОМЕРЕ:

Обзоры и лекции

А.Т. Быков, А.А. Дюжиков, Т.Н. Маляренко

Генетическая информация для персонализации прогноза, профилактики и лечения некоторых социально значимых заболеваний 4

Б.В. Дривотинов, Е.Н. Апанель, А.С. Мастыкин, В.А. Головко, Г.Ю. Войцехович

Прогнозная диагностика транзиторных ишемических атак: лечебно-профилактическое предупреждение 9

В.П. Заневский, А.Е. Кулагин

Принципы интенсивной терапии после

абдоминальных операций 16

Л.А. Казеко, Л.Л. Александрова, А.Г. Довнар

Грибковая инфекция ротовой полости 21

Часть I 21

Е.Г. Коломиец

Изменения в зубочелюстно-лицевой системе пациентов с аномалиями II класса 1 и 2 подклассов после устранения патологии за счет выдвижения нижней челюсти 26

Г.Г. Максименя

Проведение фармакотерапии у детей неонatalного периода 34

А.В. Тарасенко

Анализ результатов диагностики и лечения деструктивного панкреатита 42

Е.В. Чаплинская

Стрессиндуцированные и возрастзависимые изменения содержания фактора роста нервов в тканях организма экспериментальных животных 46

И.Д. Шляга, Д.Д. Редько, Е.С. Ядченко

Принципы лечения микозов в оториноларингологии 49

Оригинальные научные публикации

Т.А. Артемчик

Состояние здоровья детей первого года жизни с врожденной цитомегаловирусной инфекцией 54

Н.В. Волчок

Современные аспекты развития полипов эндометрия в репродуктивном периоде 56

В.А. Гинюк, Е.С. Левша, С.П. Маляревич

Современные тенденции, закономерности и структура ургентной хирургической патологии, потребовавшей экстренного оперативного вмешательства 58

И.В. Дорохович, Г.П. Дорохович

Морфология мужской половой железы у зародышей и плодов человека 61

Ф.И. Казаков, В.В. Кирковский

Выбор оптимального непокрытого угольного сорбента для изготовления отечественных массообменных устройств для гемоперfusionи однократного применения 65

О.В. Калачик, Д.Н. Садовский, Т.В. Амвросьева,

М.В. Козлова, Г.В. Жук, Н.В. Поклонская,

З.Ф. Богуш, Е.П. Кишкуро

Катамнез цитомегаловирусной инфекции у реципиентов почечного трансплантата 68

Е.М. Кострова, Д.А. Сикорская

Анализ эффективности тромбопрофилактики при кесаревом сечении у женщин с патологией сердечно-сосудистой системы 72

П.П. Кошевский, С.А. Алексеев,

Н.Я. Бовтюк, Л.В. Картун

Коррекция эндотоксикоза и дисбаланса противовоспалительных цитокинов в раннем послеоперационном периоде у пациентов с механической желтухой и желчной гипертензией неопухолевой этиологии 74

И.М. Лосик

Экономическая эффективность местной профилактики кариеса зубов у детей, страдающих детским церебральным параличом 79

Т.А. Лоскутова, К.В. Воронин, В.Н. Турчин

Прогноз осложнений гестации у беременных с преэклампсией 81

О.Г. Лютаревич, С.И. Кривенко

Влияние уровня растворимого рецептора к интерлейкину-6 в плазме крови пациентов с острым миелобластным лейкозом на результат терапии индукции ремиссии 84

Н.В. Мановицкая, О.Н. Харевич, Г.Л. Бородина

Способ определения тяжести клинико-функционального состояния пациентов с муковисцидозом 87

В.М. Мицуря, С.В. Жаворонок, Е.И. Козорез

Гепатит С у ВИЧ-инфицированных пациентов: клинико-лабораторная характеристика и лечение 89

О.В. Мурашко, О.К. Кулага,

И.В. Горудко, Д.В. Григорьева, О.В. Бичан

Определение активности миелопероксидазы у женщин с кистозными доброкачественными опухолями яичников 94

О.Б. Павлов, С.С. Грачев

Эффективность вариантов анестезиологического обеспечения у животных в эксперименте 96

О.Т. Прасмыцкий, А.А. Шматова

Особенности эндогенной интоксикации у новорожденных, рожденных от беременных женщин с поздним гестозом 100

Н.Н. Рубахова, Л.С. Гуляева,

К.О. Рубахов, Л.Н. Васильева, Е.В. Никитина

Дисфункция эндотелия после перенесенного гестоза, как предиктор сердечно-сосудистой патологии 102

Г.А. Соломонова

Хирургическое лечение сочетанных осложнений язвы двенадцатиперстной кишки 105

С.В. Спиридовон, Н.Н. Щетинко,

В.О. Одинцов, А.П. Шкет, О.А. Юдина,

С.И. Дрык, О.И. Солодкая, Д.Н. Садовский,

Ю.П. Островский

Опыт криоконсервации аортальных аллографтов в ГУ РНПЦ «Кардиология» 111

А.В. Тарасенко

Методы профилактики и лечения гнойно-септических осложнений и бактериальной кишечной транслокации у пациентов с деструктивным панкреатитом 115

А.А. Татур

Циркулярная резекция трахеи в лечении ее рубцовых стенозов 119

А.С. Федулов, М.С. Сельский,

Н.П. Кубарко, Т.В. Трухачева, С.В. Шляхтин

Метод лечения макроаденом гипофиза с применением фотосенсибилизатора Фотолон 124

С.В. Шахрай, П.Ю. Гаврин	В.Н. Сидоренко, Н.Г. Аринчина,
Использование лазерных технологий	В.И. Дунай, В.Ю. Бугров
в комплексном лечении инфицированных	Особенности нарушений сна
трофических язв варикозной этиологии.....	у беременных женщин
П.Ф. Юшкевич, Ф.И. Висмонт	149
Противоишемический и антиаритмический эффекты	
феноменов дистантного ишемического пре- и	
посткондиционирования в условиях возрастных	
изменений миокарда у крыс	132
В помощь практикующему врачу	
Т.А. Артемчик, И.М. Крастелева	
Клинико-лабораторные характеристики врожденной	
цитомегаловирусной инфекции в неонатальном периоде	135
С.В. Губкин	
Современные стенты.....	139
О.Б. Павлов, С.С. Грачев	
Методика анестезиологического обеспечения	
у животных в эксперименте.....	142
А.В. Платонов, М.А. Герасименко	
Современные подходы к лечению	
развивающейся дисплазии тазобедренных	
суставов у детей грудного возраста.....	145
Хроника	
С.А. Игумнов, Е.В. Семакова,	
И.Ю. Макарова	
Девиантное родительство в формировании	
нарушений психического развития в детском	
возрасте — междисциплинарная проблема	153
Юбилеи	
Александр Александрович Артишевский	
(К 80-летию со дня рождения).....	154
Анатолий Архипович Астапов	
(К 75-летию со дня рождения).....	155
Эдуард Анатольевич Доценко	
(К 50-летию со дня рождения).....	156
Елена Ивановна Скутаревская	
(К 75-летию со дня рождения).....	158
Григорий Nicolaевич Чистенко	
(К 65-летию со дня рождения).....	159

IN THE ISSUE:

Original scientific publications

T.A. Artsiomchyk	V.M. Mitsura, S.V. Zhavoronok, E.I. Kozorez
Health status of children at 1 year of age with	Hepatitis c in HIV infected patients: clinical and
congenital cytomegalovirus infection	laboratory characteristics and treatment.....
N.V. Volchok	89
Modern viewes on endometrial's polyps developmen	O. V. Murashko, O.K Kulaga, I.V. Gorudko,
in reproductive period.....	D. V. Grigoriev, O. V. Bichan
V.A. Giniuk, A.S. Liausha, S.P. Maljarevich	Determination of activity mieloperoxidasis at women
Current trends, patterns and structure of sharp surgical	with cystic ovarian tumors.....
pathology de-manded emergency surgery	94
I.V. Darakhovich, H.P. Darakhovich	O.B. Pavlov, S.S. Gratchev
Development of human testis morphology during the	Efficiency of variants of anesthetic management
embryonic and fetal periods	experimental animals
F.I. Kazakov, V.V. Kirkovsky	96
Optimal choice of uncovered coal hemosorbent	O.T. Prasmytski, A.A Shmatova
for domestic massexchange device for	Features endointoxication in infans born from
hemocarboperfusion	a pregnant woman with late gestosis
O. V. Kalachyk, D.N. Sadovski, T. V. Amvrosieva,	100
M.V. Kozlova, G.V. Zhuk, N.V. Poklonskaia,	N.N. Rubakhava, L.S. Guliaeva, K.O. Rubakhov,
Z.F. Bogush, E.P. Kishkurno	L.N. Vasileva, E.V. Nikitina
Katamnesis of the cytomegalovirus infection in the kidney	Endotelial dysfunktion after preeclampsia as a
transplant recipients	predictor of cardiovascular diseases
E. M. Kostrova, D. A. Sikorskaya	102
Analysis of the effectiveness of thromboprophylaxis	G.A. Solomonova
for caesarean section in women with cardio-vascular system	Surgical treatment of combined duodenal ulcer
pathology	complications
P.P. Koshevsky, S.A. Alekseev, N.J. Bovtiuk,	105
L.V. Kartun	S.V. Spiridonau, M.M. Shchatsinka,
Correcting the endotoxemia and the imbalance of	V.A. Adzintsov, A.P. Shket, O.A. Yudina, S.I. Dryk,
pro-antiinflammatory cyto-kines in patients with	O.I. Solodkaya, D.N. Sadovskiy, Y.P. Ostrovsky
obstructive jaundice and bile hypertension nonneoplastic	Experience of aortic allografts cryopreservation in the
origin in the early postoperative period.....	republican scientific and practical centre "Cardiology"
I.M. Losik	111
Economic efficiency of local prevention of caries at	A.V. Tarasenko
children having children's cerebral paralysis	Methods of prevention and treatment septic
T.A. Loskutova, K.V. Voronin, V.N. Turchin	complications and bacterial in-testinal translocation
Prognosis of pregnancy complications in women with	in patients with destructive pancreatitis.....
pre-eclampsia	115
O. G. Liutarevich, S.I. Krivenko	A.A.Tatur
Influence of sil-6r plasma level on the result of induction	Circular tracheal resection in treatment
therapy in acute myeloid leukemia patients	of cicatricial stenosis
N.V. Manovitskaya, O.N. Harevich, G.L. Borodina	119
The method of determining the severity of clinical and	A.S. Fedulau, M.S. Sielski, N.P. Kubarko,
functional status of patients with cystic fibrosis	T.V. Trukhachova, S.V. Shlyahktin
124	Treatment technology for pituitary macroadenomas
	using a photosensitizer Photolon
	128
	S.V. Shakhrai, P.Yu. Gavrin
	Use of laser technologies in complex treatment of infected
	trophic ulcers of varicose aetiology.....
	128
	P.F. Jushkevich, F.I. Vismont
	Antiischemic and antiarrhythmic effects phenomenons of
	remote ischemic pre- and postconditioning in condition
	age-related changes in the myocardium in rats.....
	132

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Экспериментальное изучение свойств мышечных релаксантов производится только под общей анестезией с ИВЛ. В то же время недостаточно данных о способах премедикации и вводной анестезии у животных в условиях эксперимента. Для анализа различных способов премедикации и вводной анестезии у животных в ходе изучения эффективности мышечных релаксантов в исследование было включено 320 собак массой тела от 5 до 35 кг и 50 кошек. За 40 минут до вводной анестезии проводилась неспецифическая премедикация, заключающаяся во внутримышечном введении фармакологических препаратов. Вводная анестезия проводилась с использованием ингаляционных и неингаляционных анестетиков.

В ходе исследования было установлено, что у животных оптимальна методика премедикации, включавшая сочетание наркотического анальгетика, М-холиноблокатора и антигистаминного препарата. Эффективна методика вводной анестезии с использованием барбитуратов, пропофола, кетамина, ингаляционных анестетиков.

Ключевые слова: общая анестезия, анестезия у животных, экспериментальная анестезиология, премедикация, вводная анестезия.

O.B. Pavlov, S.S. Gratchev

EFFICIENCY OF VARIANTS OF ANESTHETIC MANAGEMENT EXPERIMENTAL ANIMALS

Experimental study of the properties of the muscle relaxants made only under general anesthesia with mechanical ventilation. At the same time, the lack of data about how premedication and induction of anesthesia in animals under experimental conditions. To analyze the various ways premedication and induction of anesthesia the animals during the study of the effectiveness of muscle relaxants in the study included 320 dog weighing 5 to 35 kg and 50 cats. 40 minutes before the induction of anesthesia was carried out non-specific premedication, consisting of intramuscular administration of pharmacological agents. Induction of anesthesia was conducted with the use of inhaled and noninhaled anesthetics.

In the study, it was found that the optimal method of sedation of animals, which included a combination of a narcotic analgesic, M-cholinergic antagonists and antihistamine drug. Effective method of induction of anesthesia with the use of barbiturates, propofol, ketamine, inhalational agents.

Key words: general anesthesia, anesthesia in animals, experimental anesthesiology, premedication, induction of anesthesia.

Периферические мышечные релаксанты — вещества, избирательно блокирующие передачу импульсов в нервно-мышечных синапсах скелетных мышц [5,6]. Значение периферических миорелаксантов в комплексе современной анестезии и интенсивной терапии трудно переоценить. Впервые с их помощью анестезиологи получили возможность направленной регуляции определенной функции организма, что явилось не только одним из новых тактических приемов, но и позволило также пересмотреть принципиальные взгля-

ды на общую анестезию [5,15,16]. Появилась возможность и целесообразность ведения наркоза на поверхностном уровне, а также условия для применения ИВЛ, что позволило выяснить чрезвычайно важную роль управления газообменом во время операции. Таким образом, были заложены основы прогрессивной концепции многокомпонентности анестезии. Миорелаксанты заняли прочное положение в анестезиологии, и, в настоящее время, вряд ли можно представить современную общую анестезию без их применения.



Расслабление скелетных мышц, достигаемое с помощью миорелаксантов, составляет один из основных компонентов комбинированной анестезии [1,2]. В настоящее время четко определены основные показания к применению миорелаксантов в клинике. Их применяют при хирургических вмешательствах в комбинации с наркотическими анальгетиками и общими анестетиками, не обеспечивающими достаточного расслабления скелетной мускулатуры; при операциях на органах грудной полости с искусственной вентиляцией легких; для расслабления мускулатуры при проведении интубации трахеи и эндоскопических манипуляций, вправлении вывихов, репозиции отломков костей; при глубоких расстройствах газообмена различной этиологии для выключения спонтанного дыхания и обеспечения условий для проведения искусственной вентиляции легких; при гипотермии для устранения дрожи в период охлаждения и последующей ригидности мышц во время операции; для купирования судорожного синдрома при эклампсии, эпилепсии [5,14].

В процессе создания новых, более совершенных миорелаксантов используют разнообразные методы исследования. Миопаралитическую активность миорелаксантов исследуют на различных животных и на их нервно-мышечных препаратах. Изучение эффекта мышечных релаксантов проводят на животных в условиях общей анестезии, а также после децеребрации [6,9]. Чувствительность к миорелаксантам у человека наиболее близка к таковой у кошки, а продолжительность действия наиболее близка к таковой у собаки, поэтому, именно эти животные используются на заключительном этапе исследования миорелаксантов перед их клиническими испытаниями [7,8,14]. Более существенная информация о фармакодинамических эффектах миорелаксантов может быть получена на экспериментальных животных в условиях наркоза [14]. В настоящее время запрещено проведение исследований на животных в условиях тотальной миорелаксации без адекватной анестезии [9,17]. Изучение фармакологических эффектов миорелаксантов на собаках требует проведения надежной защиты (общей анестезии) от агрессивных факторов внешней и внутренней среды, ИВЛ, контроля за жизненно-важными функциями организма [10,11,13]. Погрешности при проведении ИВЛ — необеспечение проходимости дыхательных путей, неадекватные параметры ИВЛ (дыхательный объем и минутный объем дыхания) — отрицательно сказываются на результатах экспериментов и приводят к гибели животного [3,4,12]. В доступной литературе этот вопрос освещен недостаточно, что и послужило основанием для написания данной статьи.

Цель работы: повышение эффективности и безопасности методов общей анестезии у экспериментальных животных при изучении действия мышечных релаксантов.

Задачи исследования: анализ различных способов премедикации и вводной анестезии у животных в ходе изучения эффективности мышечных релаксантов.

Материал и методы

Лабораторные исследования миорелаксирующих свойств соединений бис-четвертичных аммониевых солей амидов дикарбоновых кислот проводились на базе лаборатории физиологии и экспериментальной патологии ЦНИЛ БГМУ. В настоящее исследование было включено 320 здоровых, прошедших 10-дневный карантин, собак обоего пола массой тела от 5 до 35 кг и 50 кошек. Подготовка животных начиналась с лишением их пищи за 24 часа до эксперимента. Прекращалось кормление с целью опорожнения желудка и кишечника, что предотвращало возможные осложнения (рвота, регургитация и аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути). За 40 минут до начала вводной анестезии проводилась неспецифическая премедикация, заключающаяся во внутримышечном введении фармакологических препаратов, с целью обезболивания, седации и

устранения вагусных эффектов [7]. В качестве препаратов для премедикации применялись М-холиноблокаторы, опиоидные анальгетики, антигистаминные препараты. Вводная анестезия проводилась с использованием ингаляционных и неингаляционных анестетиков.

После проведенной неспецифической премедикации животные поступали в операционную в спокойном состоянии, фиксировались на операционном столе в положении лежа на спине. В условиях асептики и антисептики производились следующие манипуляции: пунктировалась и катетеризировалась вена конечности, производился забор крови для биохимических исследований, начиналась инфузия коллоидно-кристаллоидных растворов и глюкозы, накладывались электроды для записи ЭКГ и миограммы.

Вводный наркоз осуществлялся неингаляционными и или ингаляционными общими анестетиками. Эффективность вводной общей анестезии определяли по клиническим критериям. Если период вводного наркоза протекал гладко (без выраженного возбуждения и осложнений), быстро развивалась хирургическая стадия наркоза (в течение 30-60 сек), вводная анестезия считалась хорошей. В случае выраженного возбуждения, появления различных осложнений в виде рвоты, нарушения сердечного ритма, замедления наступления хирургической стадии наркоза вводная анестезия считалась недостаточной.

Применялась следующая методика обеспечения проходимости дыхательных путей, проведения адекватной ИВЛ и контроля за животными (собаками и кошками) во время ИВЛ [9,12]: через 40 мин после неспецифической премедикации животное укладывалось на операционный стол в положении на спине и фиксируется. Проводилась пункция и катетеризация подкожной вены бедра и с целью вводной анестезии внутривенно вводится тиопентал натрия 5,08 мг/кг до наступления хирургической стадии наркоза, затем дитилин 0,3 мг/кг. Через 40 с проводилась интубация трахеи под прямой ларингоскопией у собак с массой тела до 10 кг эндотрахеальной трубкой N-7,5; с массой тела 11-20 кг – эндотрахеальной трубкой N-9,0; с массой тела свыше 20 кг – эндотрахеальной трубкой N-11,0 с раздувной манжеткой. Кошки массой тела 2-4 кг интубировались эндотрахеальной трубкой N-3,0 без раздувной манжетки. ИВЛ проводится респиратором МК-1 воздушно-кислородной смесью (содержание кислорода во вдыхаемой смеси до 50%) в режиме нормовентиляции. Дыхательный объем в мл у собак рассчитывается, исходя из их массы тела:

- с массой тела до 8 кг – кг умножаются на 20;
- с массой тела от 8 до 14 кг – кг умножаются на 15;
- с массой тела от 14 до 25 кг – кг умножаются на 12;
- с массой тела свыше 25 кг – кг умножаются на 10;
- Дыхательный объем в мл у кошек рассчитывался умножением кг на 10.

Контроль за адекватностью ИВЛ проводился по цвету видимых слизистых оболочек (язык – розовый), давлению на вдохе (по манометру респиратора давление в пределах 8-12 см. вод. ст.), экскурсии и аусcultации грудной клетки (дыхательные шумы проводились одинаково с обеих сторон), кардиомониторингу (стабильность показателей: числа сердечных сокращений, артериального давления, отсутствие признаков гипоксии и ишемии на ЭКГ), показателям КОС смешанной крови (стабильность показателей КОС).

Глубина анестезии определялась клинически (по уровню АД, по частоте пульса, форме и реакции на свет зрачка, выраженности рефлексов). Фармакологические свойства миорелаксанта изучались акцелерометрически на фоне третьей стадии наркоза, поддерживаемой различными сочетаниями ингаляционных и неингаляционных общих анестетиков. Скорость развития нервно – мышечной блокады, длительность миоплегии, ско-

█ Оригинальные научные публикации

Таблица 1. Различные варианты неспецифической премедикации и их эффективность

Варианты премедикации			
Порядковый номер	Лекарственный препарат	доза (мг/кг, M±SD)	Эффективность
1	Морфин	3,35±1,02	недостаточная
2	Скополамин	0,5±0,01	недостаточная
3	Метацин	0,13±0,02	недостаточная
4	Дипразин	2,3±0,5	недостаточная
5	морфин атропин	2,02±0,7 0,08±0,02	хорошая
6	Морфин Дипразин	2,3±0,4 6,4±1,05	недостаточная
7	Морфин Димедрол	2,27±0,91 0,86±0,07	хорошая
8	Морфин Димедрол Атропин	3,0±0,94 1,0±0,07 0,14±0,08	хорошая
9	промедол атропин	3,11±0,09 0,05±0,01	хорошая
10	Промедол Скополамин	3,33±0,92 0,04±	хорошая
11	Промедол Диазепам	2,7±0,04 1,1±0,07	хорошая
12	Фентанил	0,02±0,001	недостаточная
13	Промедол Димедрол Атропин	2,85±0,05 2,25±0,1 0,05±0,004	хорошая
14	фентанил атропин	0,005±0,001 0,053±0,04	недостаточная
15	Фентанил Дроперидол Скополамин	0,015±0,001 1,0±0,02 0,05±0,002	недостаточная
16	Анфин Атропин	0,31±0,02 0,38±0,03	хорошая
17	Буторфанол Атропин	0,03±0,004 0,07±0,002	недостаточная

рость восстановления нервно – мышечной проводимости регистрировались с помощью электромиографа, а также акцелерографа. Для этой цели проводилось чрезкожное раздражение локтевого нерва животного супрамаксимальными ритмичными прямоугольными стимулами продолжительностью 0,5 – 1,0 мс, которое наносилось как одиночными (10 – 20 стимулов в 1 мин), так и короткими сериями с регистрацией сокращений мышц пальца.

Результаты и обсуждение

Эффективность премедикации оценивали по клиническим признакам. Если животное поступало в операционную в сонном состоянии, слабо реагировало на фиксацию на операционном столе и катетеризацию периферической вены, не отмечалось саливации, третья стадия наркоза развивалась без возбуждения, то эффект премедикации считали хорошим. Если у животного отмечались проявления возбуждения, реакция сопротивления при укладке и фиксации на столе и внешние раздражители, то эффект премедикации определялся как недостаточный (табл. 1.).

Хороший эффект премедикации наблюдался у 290 собак из 320 (90,1%) и 32 из 50 кошек (64%).

Вводная анестезия осуществлялась неингаляционными и или ингаляционными общими анестетиками. Эффективность

вводной общей анестезии определяли по клиническим критериям. Если период вводной анестезии протекал гладко (без выраженного возбуждения и осложнений), быстро развивалась хирургическая стадия наркоза (в течение 30-60 сек), вводная анестезия считалась хорошей. В случае выраженного возбуждения, появления различных осложнений в виде рвоты, нарушения сердечного ритма, замедления наступления хирургической стадии наркоза вводная анестезия считалась недостаточной. Варианты использовавшегося вводного наркоза, дозировки анестетиков и оценка эффективности представлены в табл. 2.

Эффективной вводная анестезия была у 297 собак из 320 (93%) и 37 из 50 кошек (74%).

Таким образом, можно признать эффективной схему премедикации, включавшую: морфин с атропином, с димедролом, сочетание трех указанных препаратов, сочетание атропина с промедолом, со скополамином, а также сочетание промедола с дазепамом. Также считаем целесообразным у животных в эксперименте методику премедикации включающую атропин, димедрол и промедол, а также атропин и анфин в указанных выше дозировках. В описанной группе была неэффективна премедикация одним препаратором: морфином, метацином, дипразином, фентанилом в указанных дозировках, а также сочетанием нескольких препаратов – морфина с дипразином,

Таблица 2. Различные варианты вводной анестезии и их эффективность

Варианты вводной анестезии			
№ п/п	Лекарственный препарат	доза (мг/кг, в/м) M±SD	Эффективность
1	Тиопентал натрия	8,77±1,07	хорошая
2	Тиопентал натрия Фентанил	5,05±2,37 0,011±0,0008	хорошая
3	Тиопентал натрия Фентанил Дроперидол	4,85±2,85 0,009±0,003 0,26±0,06	хорошая
4	Галотан	1,6±0,05 об%	хорошая
5	Пропофол	2,6±0,7	хорошая
6	Кетамин	17,3±12,1	хорошая
7	Кетамин Диазепам	5,22±1,44 0,33±0,05	хорошая
8	Диэтиловый эфир	8,9±0,9 об%	недостаточная
9	Закись азота с кислородом (N2O + O2)	2 : 1	недостаточная

фентамила с атропином, буторфанола с атропином, фентамила с дроперидолом и скополамином в описанных дозировках.

Следует признать эффективными следующие варианты вводной анестезии у животных в эксперименте при изучении свойств мышечных релаксантов: тиопентал натрия в моноварианте, сочетание тиопентала натрия с фентанилом, а также с фенанилом и дроперидолом в указанных выше дозировках. Также была эффективна вводная анестезия пропофолом, кетамином, ингаляционным анестетиком галотаном, а также сочетанием внутривенного введения кетамина и диазепама. Была неэффективной индукция диэтиловым эфиром (в настоящее время не применяется даже в условиях эксперимента), а также закисью азота с кислородом в соотношении 2:1.

Выводы

1. Следует признать эффективной в условиях эксперимента методику премедикации у собак и кошек, включающую сочетание наркотического анальгетика, М-холиноблокатора и антигистаминного препарата, а также сочетание опиатов с бензодиазепинами.

2. В описанной группе животных была эффективна вводная анестезия барбитуратами, пропофолом, кетамином, ингаляционным анестетиком, а также сочетание барбитуратов с фентанилом и дроперидолом, кетамина с бензодиазепинами.

3. Описанный вариант оптимизированной премедикации и вводной анестезии, заключающееся в простой и надежной методике, может широко применяться у собак и кошек при проведении различных оперативных вмешательств и манипуляциях, как с научно-исследовательскими, так и лечебными целями.

Литература

- Богданов, А.А. Тенденция развития новых лекарственных средств в анестезиологии. // <http://www.Rusanesth.com>.
- Изучение нового отечественного миорелаксанта дитолония в эксперименте / А.С. Захаревский, О.Т. Прастмыцкий, Л.А. Мелентович, О.Б. Павлов // Актуальные вопросы искусственной вентиляции легких» Матер. Международная конф. врачей-анестезиологов.- Мин., 1997.-С.16-18.
- Изучение миорелаксирующей активности в ряду биситетвертичных аммониевых солей амидов дикарбоновых кислот. / Л.А. Мелентович, А.С. Захаревский, Э.А. Хиониди, А.Н. Буянова, О.Б. Павлов, Н.Д.

Таганович / Матер. конф., посвященной 25-летию ЦНИЛ БелГИУВ. Минск, 1997. Кн. 1. С. 195-197.

4. Искусственная вентиляция легких у животных / О.Т. Прастмыцкий, О.Б. Павлов, Э.А. Хиониди / Актуальные вопросы искусственной вентиляции легких. Матер. Международная конф. врачей-анестезиологов. – Мин., 1997. – С. 58-59.

5. Лекманов, А.У. Мышечные релаксанты в практике анестезиолога-реаниматолога. – Смоленск: Альфа-Принт, 1995.

6. Новые миорелаксанты. (химия, фармакология, клиника) /Под ред. Д.А. Харкевича.- М.: Медицина.- 1983.- 272 с.

7. Павлов, О.Б. Влияние неспецифической премедикации на фармакологические свойства нового отечественного недеполяризующего миорелаксанта периферического действия дитолония. Матер. 4-го съезда анестезиологов – реаниматологов РБ. Гродно, 2000. С. 83.

8. Павлов, О.Б., Прастмыцкий О.Т., Захаревский А.С. Изучение фармакологических свойств новых отечественных миорелаксирующих препаратов. Матер. пленума анестезиологов-реаниматологов РБ. МН., 1999. С. 73-74.

9. Павлов, О.Б., Прастмыцкий О.Т., Мелентович Л.А., Хиониди Э.А. Проведение анестезиологического пособия у экспериментальных животных. Методические рекомендации МЗ РБ. Мин., 1999.

10. Павлов, О.Б. Проведение анестезиологического пособия у собак при исследовании фармакологических свойств новых миорелаксирующих препаратов. Труды молодых ученых МГМИ. Мин., 1998. С. 223-227.

11. Проведение анестезиологического обеспечения экспериментов у крупных лабораторных животных. / О.Б. Павлов, О.Т. Прастмыцкий, Л.А. Мелентович, И.Н. Жук, И.Н. Никифорова / Матер. Белорусско-Британского симпозиума. Мин., 1998. С. 20-21.

12. Проведение эндотрахеального наркоза у экспериментальных животных. / О.Т. Прастмыцкий, О.Б. Павлов, Л.А. Мелентович / Матер. Белорусско-Британского симпозиума. Мин., 1998. С. 21-22.

13. Требования к доклиническому изучению общетоксического действия новых фармакологических веществ: Метод, рекомендации / ФМЗ СССР-М., 1985.- 19с.

14. Фармакология миорелаксантов /Под ред. Д.А. Харкевича.- М. Медицина, 1989.-287с.

15. Харкевич, Д.А. Фармакология куареподобных средств.- М.: Медицина, 1969.-318 с.

16. Харкевич, Д.А. Новые куареподобные и ганглиоблокирующие средства. М., 1976.

17. Этические вопросы использования животных в учебной работе и научных исследованиях: Материалы Белорусско-Британского симпозиума. – Минск, 1998. – 28 с.

Поступила 4.07.2013 г.