

Гастроинтестинальный синдром в клинике лямблиоза у детей

Лахцутка Н.А., Кодолич О.Н., Манкевич Р.Н.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

Лямблиоз распространен повсеместно. Клиника этого заболевания у детей разнообразна и неспецифична. Одним из ведущих синдромов лямблиоза в настоящее время является гастроинтестинальный.

Целью нашей работы было охарактеризовать гастроинтестинальный синдром у больных лямблиозом детей.

Материалы и методы. В работе представлены результаты ретроспективного анализа 70 медицинских карт стационарного пациента детей, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница г. Минска» в период с 2009 по 2013 гг. с диагнозом лямблиоз. Пациенты были в возрасте от 1 до 16 лет (средний возраст – $7,3 \pm 0,5$ лет), из них 41 мальчик (58,6 %) и 29 девочек (41,4%). Средний возраст мальчиков – $7,4 \pm 0,6$ лет, девочек – $7,1 \pm 0,8$ лет, ($p > 0,05$).

Результаты исследования. Среди обследованных пациентов гастроинтестинальный синдром встречался у 74%. У 47% детей язык был обложен налетом. Рвота наблюдалась у 43% детей. Средняя продолжительность рвоты составила $2,28 \pm 0,3$ дня, кратность – от 1 до 15 раз в сутки. У детей от 1 до 6 лет рвота чаще носила повторный и многократный характер, а у детей от 7 до 16 лет – однократный ($p < 0,05$). Почти у половины (47%) детей лямблиоз сопровождался нарушением стула. Жидкий стул по типу энтерита выявлялся у 40% из общего количества больных детей. При этом средняя продолжительность диарейного периода составила $4,73 \pm 0,7$ дня. Частота стула в течение дня варьировала от 1 до 10 раз. У 7% из всех пациентов определялась задержка стула, причем все они входили в группу 7–16 лет. Абдоминальные боли беспокоили большую (64%) часть детей. Достоверно чаще жалобы на боли в животе предъявляли дети 1–6 лет по сравнению с детьми 7–16 ($77 \pm 7,2\%$ и $51 \pm 8,6\%$ соответственно, $p < 0,05$). У подавляющего большинства детей (84 %) боли локализовались в эпигастральной и околопупочной области. Признаки метеоризма выявлялись у 16% госпитализированных.

Выводы. 1. В настоящее время у большинства больных лямблиозом детей встречается гастроинтестинальный синдром. Чаще он представлен абдоминальными болями, нарушением стула, обложенностью языка и рвотой, реже – метеоризмом. 2. Боли в эпигастральной и околопупочной областях живота характерны для пациентов от 7 до 16 лет. 3. Нарушения стула чаще проявляются эпизодами диареи в течение $4,73 \pm 0,7$ дней. Для детей 1–6 лет чаще характерна повторная и многократная рвота, а для пациентов 7–16 лет – однократная.