

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневиц

04.10.2013

Регистрационный № 051-0513

**МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Белорусский государственный медицинский университет», ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, доц. М.А. Герасименко, д-р мед. наук, проф. А.В. Белецкий, А.В. Платонов

Минск 2013

Настоящая инструкция по применению разработана в целях совершенствования выбора тактики лечения врожденной дисплазии тазобедренных суставов (ВДТБС) у детей первого года жизни.

Применение предлагаемого лечебного алгоритма позволит повысить эффективность лечения и, тем самым улучшить исходы лечения ВДТБС.

Инструкция предназначена для следующих врачей–специалистов: врачей-неонатологов, врачей-травматологов-ортопедов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛГОРИТМА

- в родильном доме – новорожденные, у которых установлен диагноз ВДТБС;
- в поликлинике – пациенты, у которых установлен диагноз ВДТБС.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Не выявлено.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

- кабинет, оснащенный пеленальным столом, кушеткой;
- аппарат для ультразвуковых исследований, оснащенный датчиком 7,5 МГц.
- рентгеновский кабинет.

Методика алгоритма (см. Приложение 1).

Приложение 1
к инструкции по применению
«Метод лечения врожденной дисплазии
тазобедренных суставов у детей грудного возраста»

Алгоритм лечения врожденной дисплазии тазобедренных суставов у детей грудного возраста

Тактика лечения при ВДТБС подтвержденной УЗИ ТБС в случае выявления патологии в родильном доме			Тактика лечения при ВДТБС подтвержденной УЗИ ТБС* в случае выявления патологии в возрасте от 1-го месяца до 1-го года жизни			
Предвывих бедра (по Graf тип II подтип А, замедленная оссификация)	Предвывих бедра (по Graf тип II подтип С)	Подвывих и вывих бедра (по Graf тип III подтип А,Б; тип IV)	Предвывих бедра		Предвывих бедра (по Graf тип II подтип С)	Подвывих и вывих бедра (по Graf тип III подтип А,Б; тип IV)
			(по Graf тип II подтип А, замедленная оссификация)	(по Graf тип II подтип Б, замедленная оссификация))		
↓ пассивная ЛФК, начиная с 3-х недельного возраста ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС, при формировании сустава до типа	↓ широкое пеленание – 30 дней, затем лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение	↓ широкое пеленание – 30 дней, затем лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение	↓ пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий	↓ пассивная ЛФК, начиная с 3-х месячного возраста периодически курсы общего укрепляющего массажа ↓ ежемесячный	↓ лечение в абдукционной конструкции ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа	↓ в случае выявления вывиха показана рентгенография таза в прямой проекции ↓ лечение в абдукционной конструкции ↓

<p> I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда </p>	<p> лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ </p>	<p> лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I подтипы А, Б ↓ массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ </p>	<p> укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда </p>	<p> УЗИ контроль ТБС при формировании сустава до типа I подтипов А,Б ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда </p>	<p> II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I, подтипы А, Б ↓ лечение завершается ↓ наблюдение ортопеда </p>	<p> ежемесячный УЗИ контроль ТБС *и продолжение лечения, при формировании сустава до типа II подтипы А, Б ↓ отмена лечения в абдукционной конструкции, массаж общий укрепляющий, пассивная ЛФК ↓ ежемесячный УЗИ контроль ТБС* и продолжение лечения, при формировании сустава до типа I, подтипы А, Б ↓ массаж общий </p>
---	--	--	--	---	---	--

	<p>лечение завершается</p> <p>↓</p> <p>наблюдение ортопеда</p>	<p>лечение завершается</p> <p>↓</p> <p>наблюдение ортопеда</p>				<p>укрепляющий, пассивная ЛФК</p> <p>↓</p> <p>лечение завершается</p> <p>↓</p> <p>наблюдение ортопеда</p>
--	--	--	--	--	--	---

* Пациентам в возрасте старше 6-ти месяцев проводится рентгенография таза в прямой проекции