



МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Научно-практический рецензируемый журнал

Зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь

Свидетельство о регистрации № 25 от 17.02.2009 г.

Издается с 2002 года

Выходит один раз в три месяца

№ 1 (47) / 2014 Январь – март

Подписные индексы: в каталоге «Белпочты» – 00665; в каталоге «Роспечати» – 18300

Учредитель

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83. <http://www.bsmu.by>

Адрес для писем:

220006, г. Минск,
ул. Ленинградская, 6, каб.2
Тел.: 328-58-92

E-mail: Medjournal@tut.by

Издатель:

ИООО «Красико-Принт»
ЛИ №02330/0494499
от 08.04.2009 г.
220035, Беларусь,
г.Минск, ул.Тимирязева,
д.65 б, пом.142

Подписано в печать
с готовых диапозитивов
3.01.2014 г.

Бумага офсетная
Гарнитура FranklinGothicBookC
Печать офсетная
Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 18,6
Тираж 870 экз.
Заказ № 2929

Отпечатано
в РУП «Издательство «БДП»
Производство №1
220010, г.Минск,
ул.Мясникова, 37
ЛП №02330/04941079
от 03.04.2009 г.

© Белорусский
государственный медицинский
университет, 2014

Главный редактор А.Н. Стожаров, д-р биол. наук, проф.

Редакционная коллегия

А. В. Сикорский (ректор БГМУ, председатель редколлегии)
Е. В. Барковский (д-р биол. наук, проф., Минск)
Ф. И. Висмонт (д-р мед. наук, проф., член-корр. НАН Беларуси)
В. П. Дейкало (д-р мед. наук, проф., Витебск)
С. В. Жаворонок (первый проректор БГМУ, проф.)
И. А. Карпов (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. И. Кубарко (д-р мед. наук, проф., Минск)
О. К. Кулага (д-р мед. наук, проф., Минск)
Н. П. Митьковская (д-р мед. наук, проф., Минск)
Л. Ф. Можейко (д-р мед. наук, проф., Минск)
Т. В. Мохорт (д-р мед. наук, проф., Минск)
П. Г. Пивченко (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Прохоров (д-р мед. наук, проф., Минск)
И. В. Рачковская (д-р биол. наук, проф., Минск)
О. А. Скугаревский (д-р мед. наук, проф., Минск)
Н. Ф. Сорока (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Строцкий (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Сукало (д-р мед. наук, проф., член-корр. НАН Беларуси)
А. Д. Таганович (д-р мед. наук, проф., Минск)
Т. Н. Терехова (д-р мед. наук, проф., Минск)
С. И. Третьяк (д-р мед. наук, проф., Минск)
А.С. Федулов (д-р мед. наук, проф., Минск)
А. В. Хапалюк (д-р мед. наук, проф., Минск)
Г. Н. Чистенко (д-р мед. наук, проф., Минск)
С. Н. Шнитко (д-р мед. наук, проф., Минск)

Редакционный совет

А. Ю. Барышников (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
Ю. Е. Демидчик (д-р мед. наук, проф., Минск)
И. Н. Денисов (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
М. П. Захарченко (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
Э. В. Карамов (д-р мед. наук, проф., Москва)
С. С. Козлов (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
Ю. В. Лобзин (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Санкт-Петербург)
В. В. Малышев (д-р мед. наук, Санкт-Петербург)
М. И. Михайлов (д-р мед. наук, проф., член-корр. РАМН, Москва)
Яцек Никлинский (д-р мед. наук, проф., Белосток, Польша)
Нобору Такамура (профессор, Нагасаки, Япония)
П. И. Огарков (д-р мед. наук, проф., Санкт-Петербург)
А. А. Руденко (д-р мед. наук, проф., Киев)
Томми Лайн (профессор, Стокгольм, Швеция)
Шуниши Ямашита (профессор, Фукусима, Япония)
Н. Д. Ющук (д-р мед. наук, проф., академик РАМН, Москва)
Редактор Л.И. Жук

В НОМЕРЕ:

Обзоры и лекции	
А.Т. Быков, А.А. Дюжиков, Т.Н. Маляренко	
Генетическая информация для персонализации прогноза, профилактики и лечения некоторых социально значимых заболеваний.....	4
Б.В. Дривотинов, Е.Н. Апанель, А.С. Мастыкин, В.А. Головко, Г.Ю. Войцехович	
Прогнозная диагностика транзиторных ишемических атак: лечебно-профилактическое предупреждение.....	9
В.П. Заневский, А.Е. Кулагин	
Принципы интенсивной терапии после абдоминальных операций	16
Л.А. Казеко, Л.Л. Александрова, А.Г. Довнар	
Грибковая инфекция ротовой полости.	
<i>Часть I</i>	21
Е.Г. Коломиец	
Изменения в зубочелюстно-лицевой системе пациентов с аномалиями II класса 1 и 2 подклассов после устраниния патологии за счет выдвижения нижней челюсти.....	26
Г.Г. Максименя	
Проведение фармакотерапии у детей неонatalного периода	34
А.В. Тарасенко	
Анализ результатов диагностики и лечения деструктивного панкреатита	42
Е.В. Чаплинская	
Стрессиндуцированные и возрастзависимые изменения содержания фактора роста нервов в тканях организма экспериментальных животных	46
И.Д. Шляга, Д.Д. Редько, Е.С. Ядченко	
Принципы лечения микозов в оториноларингологии	49
 Оригинальные научные публикации	
Т.А. Артемчик	
Состояние здоровья детей первого года жизни с врожденной цитомегаловирусной инфекцией	54
Н.В. Волчок	
Современные аспекты развития полипов эндометрия в репродуктивном периоде.....	56
В.А. Гинюк, Е.С. Левша, С.П. Малевич	
Современные тенденции, закономерности и структура ургентной хирургической патологии, потребовавшей экстренного оперативного вмешательства	58
И.В. Дорохович, Г.П. Дорохович	
Морфология мужской половой железы у зародышей и плодов человека	61
Ф.И. Казаков, В.В. Кирковский	
Выбор оптимального непокрытого угольного сорбента для изготовления отечественных массообменных устройств для гемоперfusionи однократного применения	65
О.В. Калачик, Д.Н. Садовский, Т.В. Амвросьева, М.В. Козлова, Г.В. Жук, Н.В. Поклонская, З.Ф. Богуш, Е.П. Кишкуро	
Катамнез цитомегаловирусной инфекции у реципиентов почечного трансплантата	68
Е.М. Кострова, Д.А. Сикорская	
Анализ эффективности тромбопрофилактики при кесаревом сечении у женщин с патологией сердечно-сосудистой системы.....	72
П.П. Кошевский, С.А. Алексеев, Н.Я. Бовтюк, Л.В. Картун	
Коррекция эндотоксикоза и дисбаланса противовоспалительных цитокинов в раннем послеоперационном периоде у пациентов с механической желтухой и желчной гипертензией неопухолевой этиологии.....	74
И.М. Лосик	
Экономическая эффективность местной профилактики кариеса зубов у детей, страдающих детским церебральным параличом	79
Т.А. Лоскутова, К.В. Воронин, В.Н. Турчин	
Прогноз осложнений гестации у беременных с преэклампсией.....	81
О.Г. Лютаревич, С.И. Кривенко	
Влияние уровня растворимого рецептора к интерлейкину-6 в плазме крови пациентов с острым миелобластным лейкозом на результат терапии индукции ремиссии	84
Н.В. Мановицкая, О.Н. Харевич, Г.Л. Бородина	
Способ определения тяжести клинико-функционального состояния пациентов с муковисцидозом	87
В.М. Мицуря, С.В. Жаворонок, Е.И. Козорез	
Гепатит С у ВИЧ-инфицированных пациентов: клинико-лабораторная характеристика и лечение	89
О.В. Мурашко, О.К. Кулага, И.В. Горудко, Д.В. Григорьева, О.В. Бичан	
Определение активности миелопероксидазы у женщин с кистозными доброкачественными опухолями яичников.....	94
О.Б. Павлов, С.С. Грачев	
Эффективность вариантов анестезиологического обеспечения у животных в эксперименте	96
О.Т. Прасмыцкий, А.А. Шматова	
Особенности эндогенной интоксикации у новорожденных, рожденных от беременных женщин с поздним гестозом.....	100
Н.Н. Рубахова, Л.С. Гуляева, К.О. Рубахов, Л.Н. Васильева, Е.В. Никитина	
Дисфункция эндотелия после перенесенного гестоза, как предиктор сердечно-сосудистой патологии.....	102
Г.А. Соломонова	
Хирургическое лечение сочетанных осложнений язвы двенадцатиперстной кишки	105
С.В. Спиридовон, Н.Н. Щетинко, В.О. Одинцов, А.П. Шкет, О.А. Юдина, С.И. Дрык, О.И. Солодкая, Д.Н. Садовский, Ю.П. Островский	
Опыт криоконсервации аортальных аллогraftов в ГУ РНПЦ «Кардиология»	111
А.В. Тарасенко	
Методы профилактики и лечения гнойно-септических осложнений и бактериальной кишечной транслокации у пациентов с деструктивным панкреатитом	115
А.А. Татур	
Циркулярная резекция трахеи в лечении ее рубцовых стенозов.....	119
А.С. Федулов, М.С. Сельский, Н.П. Кубарко, Т.В. Трухачева, С.В. Шляхтин	
Метод лечения макроаденом гипофиза с применением фотосенсибилизатора Фотолон	124

С.В. Шахрай, П.Ю. Гаврин	В.Н. Сидоренко, Н.Г. Аринчина,
Использование лазерных технологий в комплексном лечении инфицированных трофических язв варикозной этиологии.....	В.И. Дунай, В.Ю. Бугров
128	Особенности нарушений сна у беременных женщин
П.Ф. Юшкевич, Ф.И. Висмонт	149
Противоишемический и антиаритмический эффекты феноменов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования в условиях возрастных изменений миокарда у крыс	132
В помощь практикующему врачу	
Т.А. Артемчик, И.М. Крастелева	Хроника
Клинико-лабораторные характеристики врожденной цитомегаловирусной инфекции в неонатальном периоде	С.А. Игумнов, Е.В. Семакова,
135	И.Ю. Макарова
С.В. Губкин	Девиантное родительство в формировании нарушений психического развития в детском возрасте – междисциплинарная проблема
Современные стенты.....	153
О.Б. Павлов, С.С. Грачев	Юбилеи
Методика анестезиологического обеспечения у животных в эксперименте.....	Александр Александрович Артишевский (К 80-летию со дня рождения).....
142	Анатолий Архипович Астапов (К 75-летию со дня рождения).....
А.В. Платонов, М.А. Герасименко	Эдуард Анатольевич Доценко (К 50-летию со дня рождения).....
Современные подходы к лечению развивающейся дисплазии тазобедренных суставов у детей грудного возраста.....	Елена Ивановна Скутаревская (К 75-летию со дня рождения).....
145	Григорий Николаевич Чистенко (К 65-летию со дня рождения).....
	159

IN THE ISSUE:

Original scientific publications

T.A. Artsiomchyk	V.M. Mitsura, S.V. Zhavoronok, E.I. Kozorez
Health status of children at 1 year of age with congenital cytomegalovirus infection	Hepatitis c in HIV infected patients: clinical and laboratory characteristics and treatment.....
54	89
N.V. Volchok	O. V. Murashko, O.K Kulaga, I.V. Gorudko,
Modern views on endometrial's polyps developmen in reproductive period.....	D. V. Grigoriev, O. V. Bichan
56	Determination of activity mieloperoxidasis at women with cystic ovarian tumors.....
V.A. Giniuk, A.S. Liausha, S.P. Maljarevich	O.B. Pavlov, S.S. Gratchev
Current trends, patterns and structure of sharp surgical pathology de-manded emergency surgery	Efficiency of variants of anesthetic management experimental animals
58	96
I.V. Darakhovich, H.P. Darakhovich	O.T. Prasmytski, A.A Shmatova
Development of human testis morphology during the embryonic and fetal periods	Features endointoxication in infans born from a pregnant woman with late gestosis
61	100
F.I. Kazakov, V.V. Kirkovsky	N.N. Rubakhava, L.S. Guliaeva, K.O. Rubakov,
Optimal choice of uncovered coal hemosorbent for domestic massexchange device for hemocarboperfusion	L.N. Vasileva, E.V. Nikitina
65	Endotelial dysfunktion after preeclampsia as a predictor of cardiovascular diseases
O. V. Kalachyk, D.N. Sadovski, T. V. Amvrosieva, M.V. Kozlova, G.V. Zhuk, N.V. Poklonskaia, Z.F. Bogush, E.P. Kishkurno	G.A. Solomonova
Katamnesis of the cytomegalovirus infection in the kidney transplant recipients	Surgical treatment of combined duodenal ulcer complications
68	105
E. M. Kostrova, D. A. Sikorskaya	S.V. Spiridonau, M.M. Shchatsinka,
Analysis of the effectiveness of thromboprophylaxis for caesarean section in women with cardio-vascular system pathology	V.A. Adzintsov, A.P. Shket, O.A. Yudina, S.I. Dryk,
72	O.I. Solodkaya, D.N. Sadovskiy, Y.P. Ostrovsky
P.P. Koshevsky, S.A. Alekseev, N.J. Bovtiuk, L.V. Kartun	Experience of aortic allografts cryopreservation in the republican scientific and practical centre "Cardiology"
Correcting the endotoxemia and the imbalance of pro-antiinflammatory cyto-kines in patients with obstructive jaundice and bile hypertension nonneoplastic origin in the early postoperative period.....	111
74	A.V. Tarasenko
I.M. Losik	Methods of prevention and treatment septic complications and bacterial in-testinal translocation in patients with destructive pancreatitis.....
Economic efficiency of local prevention of caries at children having children's cerebral paralysis	115
79	A.A. Tatur
T.A. Loskutova, K.V. Voronin, V.N. Turchin	Circular tracheal resection in treatment of cicatricial stenosis
Prognosis of pregnancy complications in women with pre-eclampsia	119
81	A.S. Fedulau, M.S. Sielski, N.P. Kubarko,
O. G. Liutarevich, S.I. Krivenko	T.V. Trukhachova, S.V. Shlyahktin
Influence of sil-6r plasma level on the result of induction therapy in acute myeloid leukemia patients	Treatment technology for pituitary macroadenomas using a photosensitizer Photolon
84	124
N.V. Manovitskaya, O.N. Harevich, G.L. Borodina	S.V. Shakhrai, P.Yu. Gavrin
The method of determining the severity of clinical and functional status of patients with cystic fibrosis	Use of laser technologies in complex treatment of infected trophic ulcers of varicose aetiology.....
87	128
P.F. Jushkevich, F.I. Vismont	P.F. Jushkevich, F.I. Vismont
Antiischemic and antiarrhythmic effects phenomenons of remote ischemic pre- and postconditioning in condition age-related changes in the myocardium in rats.....	132

□ В помощь практикующему врачу

О.Б. Павлов, С.С. Грачев

МЕТОДИКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Экспериментальное изучение свойств мышечных релаксантов производится только под общей анестезией с ИВЛ. В данной статье авторами приводится анализ различных методик анестезии у животных. Подробно описывается премедикация, индукция, поддержание анестезии и выведение из анестезии животных в условиях лабораторного эксперимента при изучении новых мышечных релаксантов. Авторы ссылаются на оригинальные методики проведения ингаляционной анестезии и интубации трахеи у различных животных, приводят примеры проведения общей анестезии.

Ключевые слова: общая анестезия, анестезия у животных, экспериментальная анестезиология, премедикация, вводная анестезия.

O.B. Pavlov, S.S. Gratchev

METHODS OF ANESTHESIA MANAGEMENT OF EXPERIMENTAL ANIMALS

Experimental study of the properties of the muscle relaxants made only under general anesthesia with mechanical ventilation. In this article, the authors of an analysis of different methods of anesthesia in animals. Details the premedication, induction, maintenance of anesthesia and removal of anesthesia animals in laboratory experiments in the study of new muscle relaxants. The authors refer to the original methods of inhalation anesthesia and tracheal intubation in different animals, show examples of general anesthesia.

Key words: general anesthesia, anesthesia in animals, experimental anesthesiology, premedication, induction of anesthesia.

Периферические мышечные релаксанты — вещества, избирательно блокирующие передачу импульсов в нервно-мышечных синапсах скелетных мышц [5,6]. Значение периферических миорелаксантов в комплексе современной анестезии и интенсивной терапии трудно переоценить. Впервые с их помощью анестезиологи получили возможность направленной регуляции определенной функции организма, что явилось не только одним из новых тактических приемов, но и позволило также пересмотреть принципиальные взгляды на общую анестезию [5,15,16]. Появилась возможность и целесообразность ведения наркоза на поверхностном уровне, а также условия для применения ИВЛ, что позволило выяснить чрезвычайно важную роль управления газообменом во время операции. Таким образом, были заложены основы прогрессивной концепции многокомпонентности анестезии. Миорелаксанты заняли прочное положение в анестезиологии, и, в настоящее время, вряд ли можно представить современную общую анестезию без их применения. Расслабление скелетных мышц, достигаемое с помощью миорелаксантов, составляет один из основных компонентов комбинированной анестезии [1,2]. В настоящее время четко определены основные показания к применению миорелаксантов в клинике. Их применяют при хирургических вмешательствах в комбинации с наркотическими анальгетиками и общими анестетиками, не обеспечивающими достаточного расслабления скелетной мускулатуры; при операциях на органах грудной полости с искусственной вентиляцией легких; для расслабления мускулатуры при проведении интубации трахеи и эндоскопических манипуляций, вправлении вывихов, репозиции отломков костей; при глубоких расстройствах газообмена различной этиологии для выключения спонтанного дыхания и обеспечения условий для проведения искусственной вентиляции легких; при гипотермии для устранения дрожи в период охлаждения и последующей ригидности мышц во время операции; для купирования судорожного синдрома при эклампсии, эпилепсии [5,14].

Разнообразие клинических условий, в которых применяются миорелаксанты, обусловливают необходимость иметь в

наличии у анестезиологов ряд соответствующих препаратов с разной фармакологической характеристикой. Для здравоохранения Республики Беларусь в настоящее время миорелаксанты являются препаратами, импортируемыми из стран дальнего зарубежья, потребность в них составляет около 2-х миллионов ампул в год (из них 1,5 миллиона недеполяризующих миорелаксантов) [3,8]. Очевидно, что создание отечественных периферических недеполяризующих миорелаксантов среднего и короткого действия приведет к оптимизации оказания медицинской помощи населению и экономии бюджетных средств. Поэтому, создание отечественных недеполяризующих миорелаксантов периферического действия и внедрение их в клиническую практику является актуальным.

В процессе создания новых, более совершенных миорелаксантов используют разнообразные методы исследования. Миопаралитическую активность миорелаксантов исследуют на различных животных и на их нервно-мышечных препаратах. Изучение эффекта мышечных релаксантов проводят на животных в условиях общей анестезии, а также после децирбации [6,9]. Чувствительность к миорелаксантам у человека наиболее близка к таковой у кошки, а продолжительность действия наиболее близка к таковой у собаки, поэтому, именно эти животные используются на заключительном этапе исследования миорелаксантов перед их клиническими испытаниями [7,8,14]. Более существенная информация о фармакодинамических эффектах миорелаксантов может быть получена на экспериментальных животных в условиях наркоза [14]. В настоящее время запрещено проведение исследований на животных в условиях тотальной миорелаксации без адекватной анестезии [9,17]. Изучение фармакологических эффектов миорелаксантов на собаках требует проведения надежной защиты (общей анестезии) от агрессивных факторов внешней и внутренней среды, ИВЛ, контроля за жизненно-важными функциями организма [10,11,13]. Погрешности при проведении ИВЛ — необеспечение проходимости дыхательных путей, неадекватные параметры ИВЛ (дыхательный объем и минутный объем дыхания) — отрицательно сказываются на резуль-

татах экспериментов и приводят к гибели животного [3,4,12]. В доступной литературе этот вопрос освещен недостаточно, что и послужило основанием для написания данной статьи.

Целью настоящей работы явилось повышение эффективности и безопасности методов общей анестезии у животных в эксперименте при изучении действия мышечных релаксантов.

При выполнении работы была усовершенствована методика исследования новых миорелаксирующих веществ, и уточнено содержание анестезиологического обеспечения, необходимого при различных вмешательствах у лабораторных животных. Под анестезиологическим обеспечением понимается комплекс мероприятий, направленный на защиту живого организма во время эксперимента от факторов внешней и внутренней среды, приводящих к стрессу, развитию тяжелых патологических реакций, искаложению результатов эксперимента, страданиям и смерти животного. Этот комплекс мероприятий включает в себя: 1) подготовку животного к эксперименту и наркозу (премедикация); 2) собственно анестезию (вводную и основную); 3) динамическое наблюдение и регистрацию предусматриваемых исследованием специфических параметров; 4) поддержание жизненно – важных функций организма и коррекцию их нарушений во время вмешательства и в раннем постнаркозном периоде. С целью изучения свойств миорелаксантов при проведении общей анестезии была предложена техника интубации трахеи и методика эндотрахеального наркоза у кроликов, применение медицинской резиновой перчатки для проведения общей ингаляционной анестезии у собак, кошек и кроликов, проведение ИВЛ у животных. Все указанные оригинальные методики подтверждены удостоверениями на рационализаторские предложения

Эндотрахеальный наркоз у кроликов в эксперименте может применяться при оперативном вмешательстве на органах грудной и брюшной полости, крупных сосудах, операциях, требующих тотальной миорелаксации и проведения ИВЛ, а также при исследованиях новых лекарственных препаратов. Эндотрахеальный наркоз позволяет адекватно оксигенировать животное, значительно уменьшить дозу общих анестетиков, надежно защитить организм от агрессивных факторов внешней среды во время проведения эксперимента, предупредить аспирацию желудочного содержимого.

По данным ряда авторов (Г.Н. Гиммельфарб, 1984; А.А. Буняян, 1994; и др.) интубация трахеи у кроликов очень сложная манипуляция и не проводится, поэтому проведение эндотрахеального наркоза у кроликов не практикуется, что значительно снижает качество эксперимента.

Сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии (О.Б. Павлов, О.Т. Прасмыцкий, 1998) была предложена методика интубации трахеи и проведения эндотрахеального наркоза у кроликов, массой от 3 до 6 кг, заключающаяся в следующем: через 30 мин. после неспецифической премедикации (димедрол 1% раствор 10-20 мг/кг и атропин 0,1% раствор 0,6-0,8 мг/кг внутримышечно или тиопентал натрия 1% раствор 30-50 мг/кг и атропин 0,1% раствор 0,6-0,8 мг/кг внутримышечно) кролик фиксируется на операционном столе в положении на спине. В краевую ушную вену вводится тиопентал натрия 1% раствор 30-40 мг/кг до хирургической стадии наркоза, дитилин 0,03 мг/кг. Через 30 с. возникает апноэ. Грудная клетка кролика приподнимается подкладыванием под спину 5 см валика, а голова опускается. Прямой клинок №2 ларингоскопа вводится в глотку по средней линии языка; в открывшуюся голосовую щель вводится эндотрахеальная трубка №3,0 без раздувной манжетки на 3-5 см, клинок ларингоскопа извлекается, полость глотки рыхло тампонируется марлевыми салфетками, проводится ИВЛ через эндотрахеальную трубку в режиме нормовентиляции с дыхательным объемом в мл, рассчитанным, исходя из массы тела кролика: кг умножить на 10. Анестезия поддерживается ингаляционным методом (закись азота и кислород в соотношении 1:1 и фторотан до 1,1 об%)

и неингаляционным (тиопентал натрия дробно через каждые 30 мин. в дозе 5-8 мг/кг или препаратами НЛА – дроперидол 10-12 мг/кг через каждые 60 мин., фентанил 0,01-0,012 мг/кг через каждые 30 мин. внутривенно). Экстубация производится при восстановлении адекватного самостоятельного дыхания и защитных рефлексов. Постнаркозная депрессия продолжается в течение 40-60 мин после окончания эндотрахеального наркоза.

Собаки, кошки и кролики широко используются в научно-исследовательском и учебном процессе; кроме этого, им проводятся хирургические операции при той или иной патологии. Все манипуляции с учебной, экспериментальной и лечебной целью на животных должны проводиться под наркозом. Наиболее доступным, безопасным, легко управляемым методом анестезии является масочный наркоз, при проведении которого необходимо применять специальные маски, через которые общий ингаляционный анестетик попадает в дыхательные пути. Учитывая различное строение дыхательных путей и их размеры у собак, кошек и кроликов, необходимость индивидуального подбора резиновых масок, соблюдение их герметичности, отсутствие промышленного выпуска масок для проведения ингаляционного наркоза у животных, делает проблему актуальной.

Сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ предложено использовать для проведения ингаляционного наркоза у животных вместо резиновых специальных стандартных масок резиновые медицинские перчатки. Методика заключается в следующем: в резиновой перчатке у основания обрезается 3-ий палец. В образовавшееся отверстие вставляется патрубок адаптера. С целью уменьшения мертвого дыхательного пространства остальные пальцы перчатки перевязываются у основания и привязываются к адаптеру резинкой. Проксимальная часть резиновой перчатки натягивается на лицевой череп животного выше наружных носовых ходов и фиксируется с помощью кольцевой резинки. Метод обеспечивает герметичность, что предотвращает загрязнение операционной ингаляционными анестетиками и адекватную вентиляцию легких у животных; позволяет проводить общую ингаляционную анестезию по полуоткрытыму контуру, а также ИВЛ и ИВЛ.

ИВЛ проводится животным при эндотрахеальном наркозе с экспериментальной и лечебной целью, при явлениях острой дыхательной недостаточности, при проведении оперативных вмешательств на органах грудной и брюшной полостей, а также при исследовании новых миорелаксирующих препаратов. Погрешности при проведении ИВЛ – необеспечение проходимости дыхательных путей, неадекватные параметры ИВЛ (дыхательный объем, минутный объем дыхания) – отрицательно сказываются на результатах эксперимента и приводят к гибели животного. Методы обеспечения проходимости дыхательных путей, адекватной ИВЛ и контроля за животными во время проведения ИВЛ недостаточно освещены в отечественной литературе. Предлагаемая методика обеспечения проходимости дыхательных путей, проведения адекватной ИВЛ и контроля за животными (собаками и кошками) во время ИВЛ заключается в следующем (О.Б. Павлов, 1998): через 40 мин после неспецифической премедикации животное укладывается на операционный стол в положении на спине и фиксируется. Проводится пункция и катетеризация под кожной вены бедра и с целью вводной анестезии внутривенно вводится тиопентал натрия 5,08 мг/кг до наступления хирургической стадии наркоза, затем дитилин 0,3 мг/кг. Через 40 с проводится интубация трахеи под прямой ларингоскопией у собак с массой тела до 10 кг эндотрахеальной трубкой №7,5; с массой тела 11-20 кг – эндотрахеальной трубкой №9,0; с массой тела свыше 20 кг – эндотрахеальной трубкой №11,0 с раздувной манжеткой. Кошки массой тела 2-4 кг интубируются эндотрахеальной трубкой №3,0 без раздувной манжетки. ИВЛ проводится респи-

■ В помощь практикующему врачу

ратором РО-6Н или МК-1 воздушно-кислородной смесью (содержание кислорода во вдыхаемой смеси до 50%) в режиме нормовентиляции. Дыхательный объем в мл у собак рассчитывается, исходя из их массы тела:

- с массой тела до 8 кг – кг умножаются на 20;
- с массой тела от 8 до 14 кг – кг умножаются на 15;
- с массой тела от 14 до 25 кг – кг умножаются на 12;
- с массой тела свыше 25 кг – кг умножаются на 10;

Дыхательный объем в мл у кошек рассчитывается умножением кг на 10.

Контроль за адекватностью ИВЛ проводится по цвету видимых слизистых оболочек (язык – розовый), давлению на вдохе (по манометру респиратора давление в пределах 8–12 см. вод. ст.), экскурсии и аускультации грудной клетки (дыхательные шумы проводятся одинаково с обеих сторон), кардиомониторингу (стабильность показателей: числа сердечных сокращений, артериального давления, отсутствие признаков гипоксии и ишемии на ЭКГ), показателям КОС смешанной крови (стабильность показателей КОС).

Пример методики в эксперименте:

Подготовка животных начиналась с лишением их пищи за 24 часа до эксперимента. Прекращалось кормление собак с целью опорожнения желудка и кишечника, что предотвращало возможные осложнения (рвота, регургитация и аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути). За 40 минут до начала вводного наркоза проводилась неспецифическая премедикация, заключающаяся во внутримышечном введении фармакологических препаратов, с целью обезболивания, седации и устранения вагусных эффектов. Эффективность премедикации оценивали по клиническим признакам. Если животное поступало в операционную в сонном состоянии, слабо реагировало на фиксацию на операционном столе и катетеризацию периферической вены, не отмечалось саливации, третья стадия наркоза развивалась без возбуждения, то эффект премедикации считали хорошим. Если у животного отмечались проявления возбуждения, реакция сопротивления при укладке и фиксации на столе и внешние раздражители, то эффект премедикации определялся как недостаточный. По результатам исследования следует признать эффективной в условиях эксперимента методику премедикации у собак и кошек, включающую сочетание наркотического анальгетика, М-холиноблокатора и антигистаминного препарата, а также сочетание опиатов с бензодиазепинами.

После проведенной неспецифической премедикации животные поступали в операционную в спокойном состоянии, фиксировались на операционном столе в положении лежа на спине. В условиях асептики и антисептики производились следующие манипуляции: пунктировалась и катетеризировалась вена конечности, производился забор крови для биохимических исследований, начиналась инфузия коллоидно-кристалloidных растворов и глюкозы, накладывались электроды для записи ЭКГ и миограммы.

Вводный наркоз осуществлялся неингаляционными или ингаляционными общими анестетиками. Эффективность вводной общей анестезии определяли по клиническим критериям. Если период вводного наркоза протекал гладко (без выраженного возбуждения и осложнений), быстро развивалась хирургическая стадия наркоза (в течение 30–60 сек), вводная анестезия считалась хорошей. В случае выраженного возбуждения, появления различных осложнений в виде рвоты, нарушения сердечного ритма, замедления наступления хирургической стадии наркоза вводная анестезия считалась недостаточной. В ходе проведенного исследования у животных была эффективна вводная анестезия барбитуратами, пропофолом, кетамином, ингаляционным анестетиком, а также сочетание барбитуратов с фентанилом и дроперидолом, кетамина с бензодиазепинами.

При достижении хирургической стадии наркоза части жи-

вотных внутривенно струйно вводился дитилин, а части – непосредственно исследуемый миорелаксант. На фоне тотальной миорелаксации под контролем прямой ларингоскопии проводилась интубация трахеи эндотрахеальными трубками с раздувной манжеткой. Глубина наркоза определялась клинически (по уровню АД, по частоте пульса, форме и реакции на свет зрачка, выраженности ресничного и роговичного рефлексов). Фармакологические свойства миорелаксанта изучались на фоне третьей стадии наркоза, поддерживаемой различными сочетаниями ингаляционных и неингаляционных общих анестетиков. Адекватность ИВЛ контролировалась по цвету видимых слизистых оболочек (язык – розовый), давлению на вдохе (по манометру респиратора в пределах 8 – 12 см. водного столба), экскурсии и аускультации грудной клетки (дыхательные шумы проводились одинаково с обеих сторон), кардиомониторингу (стабильность показателей числа сердечных сокращений и уровня АД, отсутствие признаков гипоксии и ишемии на ЭКГ), показателям кислотно-основного состояния капиллярной крови (стабильность показателей КОС и газового состава крови).

С целью изучения влияния исследуемого миорелаксанта на электрическую активность миокарда проводился анализ электрокардиограмм у собак на фоне его введения. Запись ЭКГ осуществлялась одноканальным аппаратом типа Салют на 2-ом стандартном отведении. ЭКГ снималась до введения миорелаксанта, через 3 мин и 60 мин после введения миорелаксанта. Расшифровывали ЭКГ общепринятым способом, обращая внимание на сердечный ритм, критерии проводимости и возбудимости миокарда.

Скорость развития нервно – мышечной блокады, длительность миоплегии, скорость восстановления нервно – мышечной проводимости регистрировались с помощью электромиографа, а также акселерографа. Для этой цели проводилось чрезкожное раздражение локтевого нерва животного супрамаксимальными ритмичными прямоугольными стимулами продолжительностью 0,5 – 1,0 мс, которое наносилось как одиночными (10 – 20 стимулов в 1 мин), так и короткими сериями с регистрацией сокращений мышц пальца. Суть метода акселерометрии заключается в измерении ускорения, возникающего в результате сокращения мышцы на стимуляцию периферического двигательного нерва. В основе метода лежит второй закон Ньютона – $F=ma$, из чего следует, что если масса неизменна, то ускорение прямо пропорционально силе. Таким образом, возможно измерение не только силы сокращения мышцы, но и ускорения. Для проведения акселерометрии применяется керамический пьезоэлектрический трансдьюсер – миниатюрный датчик давления, который прикрепляется к дистальной фаланге лапы. В ответ на стимуляцию происходит сокращение мышцы, трансдьюсер получает ускорение, в результате чего груз давит на тензодатчик с силой, пропорциональной ускорению движения. Полученный электрический сигнал обрабатывается анализатором, усиливается, измеряется и выводится на дисплей или распечатывается [1,5,6].

В зависимости от этапа операции и цели исследования чаще всего применяются следующие виды нервно-мышечной стимуляции:

- одиночная стимуляция с частотой 1 Гц и 0,1 Гц;
- четырехразрядная стимуляция.

Режим одноразрядной (одиночной) стимуляции применяется в начале операции до достижения оптимальных условий интубации трахеи, а также при работе с деполяризующими миорелаксантами. Для стимуляции используются единичные супрамаксимальные стимулы шириной 200 мкс. В режиме одиночной стимуляции на нерв подается переменный ток с частотой не более 1 Гц. Амплитуда мышечного сокращения (TW1) сопоставляется с контрольной величиной (TWc), полученной до введения миорелаксанта, принятой за 100 %. Чем меньше амплитуда ответа по сравнению с контрольной, тем больше вы-

В помощь практикующему врачу

раженность нервно-мышечного блока.

Четырехразрядная стимуляция – режим TOF. Суть данного режима заключается в том, что на локтевой нерв каждые 10 секунд подается четыре супрамаксимальных разряда при частоте 2 Гц. TOF % - отношение TW4/TW1, где TW4 и TW1-амплитуды ответов на 4-ый и 1-ый стимулы в серии из 4 – х стимулов. В присутствии недеполяризующего миорелаксанта, при амплитуде 25 % от базового значения отклик на 4-ый стимулирующий импульс (TW4) в TOF пропадает. Отклики на 3-ий и 2-ой импульсы (TW3 и TW2) пропадают при значениях TW1=20 % и TW1=10 % амплитуды соответственно. Если для миоплегии применяется деполяризующий миорелаксант, то все четыре ответа будут иметь одну величину (TW1=TW4), постепенно и одинаково снижаясь по мере углубления нервно-мышечного блока или возрастая по мере уменьшения его выраженности. В большинстве случаев стабильного состояния релаксации, соответствующего 90 %-ному снижению амплитуды (TW=10 %), то есть в состоянии, когда выявляется один-единственный отклик на стимуляцию в режиме TOF, сохраняются удовлетворительные условия мышечной релаксации на время операции.

Завершение анестезии: через 60 мин. после начала вводного наркоза подача общих анестетиков прекращалась. На фоне пробуждения при восстановлении самостоятельного адекватного дыхания и защитных гортанно – глоточных рефлексов животные были отключены от респиратора и эктубированы. При восстановлении нервно – мышечной проводимости животные становились на лапы, передвигались самостоятельно и отводились в виварий, где за ними проводилось динамическое наблюдение в течение 4 часов.

Таким образом, оптимизированное анестезиологическое пособие, заключающееся в простой и надежной методике, может широко применяться у собак, кошек и кроликов при проведении различных оперативных вмешательствах и манипуляциях, как с научно-исследовательскими, так и лечебными целями.

Литература

- Богданов, А.А. Тенденция развития новых лекарственных средств в анестезиологии. // <http://www.Rusanesth.com>.
- Изучение нового отечественного миорелаксанта дитолония в эксперименте / А.С. Захаревский, О.Т. Прасмыцкий, Л.А. Мелентович, О.Б. Павлов // Актуальные вопросы искусственной вентиляции легких. Матер. Международная конф. врачей-анестезиологов.- Мн., 1997.-С.16-18.
- Изучение миорелаксирующей активности в ряду бисчетвертичных аммониевых солей амидов дикарбоновых кислот. / Л.А. Мелентович, А.С. Захаревский, Э.А. Хиониди, А.Н. Буянова, О.Б. Павлов, Н.Д. Таганович / Матер. конф., посвященной 25-летию ЦНИЛ БелГИУВ. Минск, 1997. Кн. 1. С. 195-197.
- Искусственная вентиляция легких у животных / О.Т. Прасмыцкий, О.Б. Павлов, Э.А. Хиониди / Актуальные вопросы искусственной вентиляции легких. Матер. Международная конф. врачей-анестезиологов. – Минск, 1997. – С. 58-59.
- Лекманов, А.У. Мишечные релаксанты в практике анестезиолога-реаниматолога. – Смоленск: Альфа-Принт, 1995.
- Новые миорелаксанты. (химия, фармакология, клиника) / Под ред. Д.А. Харкевича.- М.: Медицина.- 1983.- 272 с.
- Павлов, О.Б. Влияние неспецифической премедикации на фармакологические свойства нового отечественного недеполяризующего миорелаксанта периферического действия дитолония. Матер. 4-го съезда анестезиологов – реаниматологов РБ. Гродно, 2000. С. 83.
- Павлов, О.Б., Прасмыцкий О.Т., Захаревский А.С. Изучение фармакологических свойств новых отечественных миорелаксирующих препаратов. Матер. пленума анестезиологов- реаниматологов РБ. Минск, 1999. С. 73-74.
- Павлов, О.Б., Прасмыцкий О.Т., Мелентович Л.А., Хиониди Э.А. Проведение анестезиологического пособия у экспериментальных животных. Методические рекомендации МЗ РБ. Минск, 1999.
- Павлов, О.Б. Проведение анестезиологического пособия у собак при исследовании фармакологических свойств новых миорелаксирующих препаратов. Труды молодых ученых МГМИ. Минск, 1998. С. 223-227.
- Проведение анестезиологического обеспечения экспериментов у крупных лабораторных животных. / О.Б. Павлов, О.Т. Прасмыцкий, Л.А. Мелентович, И.Н. Жук, И.Н. Никифорова / Матер. Белорусско-Британского симпозиума. Минск, 1998. С. 20-21.
- Проведение эндотрахеального наркоза у экспериментальных животных. / О.Т. Прасмыцкий, О.Б. Павлов, Л.А. Мелентович / Матер. Белорусско-Британского симпозиума. Минск, 1998. С. 21-22.
- Требования к доклиническому изучению общетоксического действия новых фармакологических веществ: Метод, рекомендации / ФК МЗ СССР- М., 1985.- 19с.
- Фармакология миорелаксантов /Под ред. Д.А. Харкевича.- М. Медицина, 1989.-287с.
- Харкевич, Д.А. Фармакология куареподобных средств.- М.: Медицина, 1969.-318с.
- Харкевич, Д.А. Новые куареподобные и ганглиоблокирующие средства. М., 1976.
- Этические вопросы использования животных в учебной работе и научных исследованиях: Материалы Белорусско-Британского симпозиума. – Минск, 1998. – 28 с.

Поступила 8.07.2013 г.