

Соколов А. С.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ

Научный руководитель канд. мед. наук Нагорнов И. В.

Кафедра военно-полевой терапии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Цирроз печени является хроническим прогрессирующим заболеванием неизбежно приводящим летальному исходу. В нашей стране, как и во всем мире несмотря на профилактические мероприятия наблюдается неуклонный рост смертности от цирроза печени.

Цель. Оценить выживаемость пациентов после выставления им диагноза «цирроз печени» и выявить факторы повлиявшие на длительность течения заболевания.

Задачи:

- 1 Определить длительность жизни пациентов после выявления цирроза печени.
- 2 Выявить факторы, неблагоприятно повлиявшие на течение заболевания.
- 3 Оценить влияние методов лечения на исход заболевания.

Материал и методы. Был произведен анализ архивных историй болезни 66 человек (59 мужчин, 7 женщин) с впервые установленным в 432 Главном военном клиническом медицинском центре диагнозом «цирроз печени». На момент исследования получена информация о состоянии пациентов или дате их летального исхода (неблагоприятный исход). Средний период наблюдения составил 9 ± 3 года. Были проанализированы: объективный статус, биохимические показатели крови, данные инструментальных методов исследования УЗИ, ФЭГДС. Оценка проводимого метода лечения производилась по назначаемым по выписке из стационара препаратам. Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием пакета статистических программ IBM SPSS 20.0.

Результаты и обсуждения. Неблагоприятный исход заболевания был отмечен у 76% (95%ДИ 64%-86%). Средняя продолжительность жизни пациентов с подтвердившимся исходом составила 7 ± 3 года и была сопряжена с классом тяжести цирроза печени, асцитом, полом, имеющимися в анамнезе данными о кровотечениях из варикозно-расширенных вен. Какого-либо влияния методов лечения на выживаемость выявлено не было.

Выводы:

- 1 За период наблюдения летальный исход был отмечен у 76% пациентов со средней продолжительностью жизни 7 ± 3 года.
- 2 На неблагоприятный исход заболевания повлияли наличие мужской пол, наличие асцита, геморрагические осложнения.
- 3 Не было выявлено значимого влияния проводимой лекарственной терапии на выживаемость при циррозе печени.