

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра
Д.Л. Пиневиц

«15.03.20» 2020 г.

Регистрационный № 025-0320

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

Инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д.м.н., профессор Терехова Т.Н., к.м.н., доцент
Бутвиловский А.В.

Минск, 2020

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен алгоритм лечения кариеса временных зубов, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение кариеса зубов у детей. Применение метода, изложенного в настоящей инструкции, позволяет адаптировать детей к стоматологическим вмешательствам и повысить качество оказания стоматологической помощи детям.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-стоматологов, врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов детских, иных врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам в стационарных и (или) амбулаторных условиях, и (или) отделениях дневного пребывания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Кариес эмали временных зубов (K02.0).
2. Кариес дентина временных зубов (K02.1).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопоказания, соответствующие таковым для медицинского применения медицинских изделий и лекарственных средств, необходимых для реализации метода, изложенного в настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДР.

1. Установка стоматологическая.
2. Средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки).
3. Набор стерильных стоматологических инструментов.
4. Стерильные ватные валики.

5. 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата.
6. Гель или лак стоматологический, содержащий кальций и фосфат.
7. Щеточка и паста для удаления зубных отложений.
8. Фторидсодержащий лак.
9. 38%-ный раствор фторида диамминсеребра (ФДС).
10. Аппликатор.
11. Стеклоиономерный пломбировочный цемент, не требующий кондиционирования дентина и защитного покрытия.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

В первое посещение:

1. Определение поведения ребенка по рейтинговой шкале Frankl-Riba.

Таблица

Рейтинговая шкала Frankl-Riba

Рейтинг	Название	Описание
1	Абсолютно негативное	отказ от лечения, сильный плач или крик, страх или любое другое явное свидетельство крайнего негативизма
2	Негативное	неохотно принимает лечение, отказывается от сотрудничества, некоторые несильно выраженные признаки негативного отношения (угрюмость, замкнутость, уход в себя)
3	Негативно-позитивное	взаимные переходы от недостаточного сотрудничества с определенными признаками негативного отношения к осторожному

		принятию лечения в течение посещения
4	Позитивное	принятие лечения, время от времени осторожность, готовность выполнять указания стоматолога, иногда с оговорками, но пациент сотрудничает с врачом-стоматологом
5	Абсолютно позитивное	хорошие отношения со стоматологом, интерес к стоматологическим манипуляциям, смех и удовольствие

2. Стоматологический осмотр ребенка.
3. Мотивация родителей ребенка.
4. Обучение родителей ребенка гигиене полости рта с акцентуацией на методе чистке зубов, рекомендации по выбору зубной пасты и зубной щетки, информирование о критериях необходимости замены зубной щетки.
5. Беседа о рациональном питании с акцентуацией внимания на режиме потребления рафинированных углеводов.
6. Назначение двухнедельного курса подавления активности кариесогенной микрофлоры (путем аппликаций в течение 30 секунд 0,05% раствора хлоргексидина после чистки зубов 2 раза в день) и реминерализации твердых тканей зуба после аппликации хлоргексидина зубов 2 раза в день (путем нанесения с использованием зубной щетки геля, содержащего кальций и фосфат, или аппликации на зубы в течение 3-х минут лака стоматологического, содержащего кальций и фосфат).

Во второе и последующие посещения:

7. Контроль выполнения назначенных мероприятий.

8. При необходимости – повторная мотивация родителей и разъяснение по возникшим вопросам.

9. Определение поведения ребенка по рейтинговой шкале Frankl-Riba.

10. Малоинвазивное лечение имеющихся кариозных поражений (аппликация фторидсодержащего лака, аппликация 38%-го раствора ФДС, аппликации стеклоиономерных цементов, не требующих кондиционирования дентина и защитного покрытия) с учетом их локализации и глубины. Рекомендуемое общее время лечения во второе посещение до 3 минут. В последующие посещения по мере адаптации ребенка целесообразно постепенное увеличение общего времени лечения.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА

Применение метода, изложенного в инструкции, не вызовет развития осложнений.